

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до гастроентерології і може використовуватись у терапевтичних відділеннях при лікуванні виразкової хвороби.

Відомий спосіб лікування хворих з хронічною інтоксикацією хромом [Яковлев Н.А., Слесарц Т.А, Залевский Л.К. Применение эндонозального электрофореза унитиола для лечения больных с ранними проявлениями хронической хромовой интоксикации //Гигиена труда и профессиональные заболевания. -1985. - № 2. - С. 13-16], який включає використання антидотного препарату унітіола, що призначається у вигляді електрофорезу (ендонозального).

Недоліком відомого способу є те, що при даному способі лікування не досягається повної детоксикації організму.

Мета - удосконалення способу лікування виразкової хвороби у хворих з хронічною інтоксикацією хромом, в якому

досягається детоксикація організму, чим забезпечується покращення всіх обмінних та біохімічних показників і за рахунок цього швидше настає ремісія захворювання, скоріше зникають болевий і диспептичний синдроми.

Мета досягається тим, що в способі лікування виразкової хвороби у хворих з хронічною хромовою інтоксикацією, що включає використання антидотних препаратів і аскорбінової кислоти, згідно винаходу, в якості антидотного препарату використовують 30%-ний розчин тіосульфату натрію, який вводять доведено 1 раз на добу на протязі 10 днів, додатково призначають ентеросгель по 14-17 г 3 рази на день.

Спосіб здійснюють наступним чином.

Хворому виразковою хворобою з ознаками хронічної інтоксикації хромом І стадії в комплексне лікування включають: тіосульфат натрію 30%-ний розчин по 10 мл доведено, 1 раз на день на протязі 10 днів; ентеросгель по 14-17 г три рази на день за 1.5 год до прийому їжі, на протязі 10 днів та аскорбінову кислоту 5%-й розчин по 3 мл два рази на день, курсом 10 днів.

Приклад. Хворий Н., 48 років, поступив в профпатологічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні зі скаргами на тупі болі в епігастрію, печію, відрижку кислим, нудоту, періодичне блювання. Йому діагностовано виразкову хворобу з локалізацією в цибуліні дванадцятипалої кишки з секреторною недостатністю, стадія загострення. Хронічна інтоксикація хромом І стадії. Призначене лікування по вищеописаному способі. Результат лікування: на 8-9-й день лікування спостерігалось покращення загального самопочуття, зникнення болевого та диспептичного синдромів, статистично достовірне зниження вмісту хрому в крові, сечі, шлунковому соці, зниження до нормальних показників рівня перекисного окислення ліпідів та нормалізація вмісту аскорбінової кислоти в крові.

Віддалені результати: відсутність загострень виразкової хвороби на протязі року спостереження.

Переваги запропонованого способу: швидке зникнення болевого та диспептичного синдромів, скорочення термінів стаціонарного лікування хворих, значне подовження періоду ремісії виразкової хвороби.