



УКРАЇНА

(19) UA (11) 3790 (13) U

(51) 7 A61N1/10, A61B17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

1

2

(21) 2004031920

(22) 16.03.2004

(24) 15.12.2004

(46) 15.12.2004, Бюл. №12, 2004р.

(72) Шевчук Сергій Вікторович

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, що включає імунодепресанти, імунотерапію, нестероїдні протизапальні засоби, який **відрізняється** тим, що хворому призначають епрекс по 150 мг/кг 3 рази на тиждень підшкірно, аскорбінову кислоту 5 % по 2 мл внутрішньом'язово щоденно, феррум лек внутрішньом'язово по 4 мл через день.

Спосіб лікування системного червоного вовчака (СЧВ) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на системний червоний вовчак.

Способи лікування СЧВ відомі. До них відносяться способи комплексної терапії, що базуються на використанні гормональних та негормональних імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних препаратів, антикоагулянтів та антиагрегантів (див - А. М. Окорочков. Лечение болезней внутренних органов. М. 1999.- т.2. - С.137-146).

Недоліком цих способів є недостатня їх ефективність, що проявляється подальшим прогресуванням і розвитком ускладнень.

В основу корисної моделі поставлене завдання розробити такий спосіб лікування, який зупиняє прогресування процесу і дає стійку ремісію.

Таке завдання забезпечується тим, що на фоні комплексної терапії системного червоного вовчака хворому дають епрекс в дозі 150мг/кг 3 рази на тиждень підшкірно на протязі 1-2міс. аскорбінову кислоту 5% по 2мл внутрішньом'язово щоденно, феррум лек внутрішньом'язово через день по 4мл. Клінічний ефект проявляється на 10-11 день. Проходять спазми судин, мерзлякуватість кінцівок, нормалізуються показники сечі.

Застосування способу

Хворому на системний червоний вовчак поряд з імунодепресантами, імунотерапією, нестероїд-

ними протизапальними засобами дають епрекс по 150мг/кг 3 рази на тиждень підшкірно на протязі 1-2міс., аскорбінову кислоту 5% по 2мл внутрішньом'язово щоденно, феррум лек внутрішньом'язово по 4мл через день. Лікування продовжують 1-2міс. до отримання стійкої ремісії, яка проявляється добрим самопочуттям, розкритістю суглобів, зникненням болю, спазму судин, нормалізацією показників сечі. Аскорбінову кислоту і феррум лек вводять з інтервалом в голину, інакше залізо інактивує вітамін С.

Конкретний приклад застосування способу

Хвора Ю., 37 років, поступила в клініку з діагнозом: системний червоний вовчак, акт. ІІст., хронічний перебіг, поліартрит, гломерулонефрит, анемія, синдром Рейно, трофічні виразки нижніх кінцівок. Призначено вольтарен, плаквеніл, трентал. Крім цього в комплекс лікування введено епрекс по 150мг/кг 3 рази на тиждень підшкірно, аскорбінову кислоту 5% по 2мл внутрішньом'язово щоденно, феррум лек внутрішньом'язово по 4мл через день. Самопочуття хворої стало покращуватись на 11-й день. Щезли болі в суглобах, попереку, пройшла мерзлякуватість кінцівок. Трофічні виразки на гомілках почали очищуватись, покриватись грануляціями, епітелізуватись. На 20-й день гемоглобін з 82г/л виріс до 125г/л. Таким чином, введення до комплексу лікування епрексу, заліза та аскорбінової кислоти сприяло швидкому досягненню ремісії захворювання.