



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **39496** (13) **U**
(51) **МПК (2009)**
A61N 1/10
A61B 17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

1

(21) u200812559
(22) 27.10.2008
(24) 25.02.2009
(46) 25.02.2009, Бюл.№ 4, 2009 р.
(72) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, UA
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ,
UA

2

(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, що включає імунодепресанти, амінохінолонові похідні, нестероїдні протизапальні засоби, який **відрізняється** тим, що хворому щоденно дають епросартан 200мг на добу.

Спосіб лікування системного червоного вовчака (СЧВ) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на СЧВ.

Способи лікування СЧВ відомі. До них відносяться способи комплексної терапії, що базуються на використанні гормональних та негормональних імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних препаратів, антикоагулянтів та антиагрегантів [див. А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. М., 1999. - т.2. - С.137-146].

Недоліком цих способів є недостатня їх ефективність, що призводить до раннього виникнення серцево-судинних ускладнень. Останньому сприяє ендотеліальна дисфункція, яка являється одним з патогенетичних механізмів розвитку атеросклерозу.

В основу корисної моделі поставлене завдання розробити такий спосіб лікування, який би знижував можливість розвитку атеросклерозу у хворих на СЧВ.

Таке завдання забезпечується тим, що на фоні комплексної терапії (гормональні і негормональні імунодепресанти, амінохінолонові похідні, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти, ан-

тиагреганти) хворому призначають епросартан по 200мг на добу. Таке призначення дозволяє досягти вазодилатації судин, зниження рівня холестерину, вплинути на агрегацію та адгезію тромбоцитів.

Застосування способу. Хворому на системний червоний вовчак поряд з режимом, дієтою, імунодепресантами, амінохінолоновими похідними, нестероїдними протизапальними препаратами призначають епросартан по 200мг на добу, що проявляється покращенням загального стану судин, покращенням функції внутрішніх органів.

Конкретний приклад застосування способу. Хвора К., 39 років, поступила в клініку з діагнозом: системний червоний вовчак, акт. П ст., хронічний перебіг, синдром Рейно. Призначено лефлуномід по 20мг на добу, плаквеніл 400мг на добу, вольтарен 0,025 2 рази на день, геларин 5000 ОД 2 рази на день, трентал по 0,2 3 рази на день. Загальний стан хворої дещо покращився, але явища синдрому Рейно залишилися. На фоні базисної терапії хворій призначено епросартан по 200мг на добу. Явища спазму судин пройшли на 6-й день, що підтверджено даними реовазографії. Лікування завершено на 14-й день.