



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **39498** (13) **U**
(51) **МПК (2009)**
A61N 1/10
A61B 17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

1

(21) u200812563
(22) 27.10.2008
(24) 25.02.2009
(46) 25.02.2009, Бюл. № 4, 2009 р.
(72) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, UA
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, UA

2

(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, що включає прийом імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних засобів, антикоагулянтів, антиагрегантів, який **відрізняється** тим, що додатково хворому призначають корвітин по 0,5 1 раз на добу протягом 10 днів.

Спосіб лікування системного червоного вовчака (СЧВ) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на СЧВ.

Способи лікування СЧВ відомі. До них відносяться способи комплексної терапії, що базуються на використанні гормональних та негормональних імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних препаратів, антикоагулянтів та антиагрегантів [див. А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. М., 1999. - т.2. - С. 137-146].

Недоліком цих способів є недостатня їх ефективність, що призводить до раннього виникнення серцево-судинних ускладнень. Останньому сприяє ендотеліальна дисфункція, яка являється одним з патогенетичних механізмів розвитку атеросклерозу.

В основу корисної моделі поставлене завдання розробити такий спосіб лікування, який би знижував можливість розвитку атеросклерозу у хворих на СЧВ.

Таке завдання забезпечується тим, що на фоні комплексної терапії (гормональні і негормональні імунодепресанти, амінохінолонові похідні, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти, антиагреганти) хворому призначають корвітин по 0,5 1 раз на добу на протязі 10 днів.

Застосування способу. Хворому на системний червоний вовчак поряд з режимом, дієтою, імунодепресантами, амінохінолоновими похідними, нестероїдними протизапальними препаратами, антикоагулянтами, антиагрегантами призначають корвітин по 0,5 1 раз на добу на протязі 10 днів.

Конкретний приклад застосування способу. Хвора С, 48 років, поступила в клініку з діагнозом: системний червоний вовчак, акт. II ст., хронічний перебіг, транзиторні ішемічні атаки (ТІА). Призначено лефлуномід по 20мг на добу, плаквеніл 400мг на добу, індометацин по 1 т. 2 рази на добу. Проведене лікування покращило стан хворої, однак залишалися біль в голові і запаморочення. Призначено корвітин по 0,5 1 раз на добу на протязі 10 днів. Вказані явища з боку головного мозку повністю пройшли.