



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **39499** (13) **U**
(51) **МПК (2009)**
A61N 1/10
A61B 17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

1

(21) u200812564
(22) 27.10.2008
(24) 25.02.2009
(46) 25.02.2009, Бюл.№ 4, 2009 р.
(72) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, UA
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ,
UA

2

(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, що включає імунодепресанти, амінохінолонові похідні, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти, антиагреганти, який **відрізняється** тим, що хворому призначають нітрєндипін по 10мг на добу.

Спосіб лікування системного червоного вовчака (СЧВ) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на СЧВ.

Способи лікування СЧВ відомі. До них відносяться способи комплексної терапії, що базуються на використанні гормональних та негормональних імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних препаратів, антикоагулянтів та антиагрегантів [див. А.Н. Огороков. Лечение болезней внутренних органов. М., 1999. -т.2. -С.137-146].

Недоліком цих способів є недостатня їх ефективність, що призводить до раннього виникнення серцево-судинних ускладнень. Останньому сприяє ендотеліальна дисфункція, яка являється одним з патогенетичних механізмів розвитку атеросклерозу.

В основу корисної моделі поставлене завдання розробити такий спосіб лікування, який би знижував можливість розвитку атеросклерозу у хворих на СЧВ.

Таке завдання забезпечується тим, що на фоні комплексної терапії (гормональні і негормональні

імунодепресанти, амінохінолонові похідні, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти, антиагреганти) хворому призначають нітрєндипін по 10мг на добу.

Застосування способу. Хворому на системний червоний вовчак поряд з режимом, дієтою, імунодепресантами, амінохінолоновими похідними, нестероїдними протизапальними препаратами, антикоагулянтами, антиагрегантами призначають нітрєндипін по 10мг на добу, що проявляється покращенням загального стану судин, покращенням функції внутрішніх органів.

Конкретний приклад застосування способу. Хвора Я., 47 років, поступила в клініку з діагнозом: системний червоний вовчак, акт. II ст., хронічний перебіг, коронаркардіосклероз, склероз судин головного мозку. Призначено лефлуномід по 20мг на добу, плаквеніл 400мг на добу, гепарин по 2500 ОД двічі на добу. Стан хворої покращився, але залишились болі в області серця, запаморочення. На фоні базисної терапії хворій призначено нітрєндипін по 10мг на добу. На 5-й день біль і запаморочення пройшли.