



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **39500** (13) **U**  
(51) **МПК (2009)**  
**A61N 1/10**  
**A61B 17/00**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під  
відповідальність  
власника  
патенту

### (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

1

(21) u200812566  
(22) 27.10.2008  
(24) 25.02.2009  
(46) 25.02.2009, Бюл.№ 4, 2009 р.  
(72) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, UA  
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, UA

2

(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, що включає прийом імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних препаратів, антикоагулянтів, антиагрегантів, який **відрізняється** тим, що хворому додатково призначають предуктал MR по 1 т. 2 рази на добу.

Спосіб лікування системного червоного вовчака (СЧВ) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на СЧВ.

Способи лікування СЧВ відомі. До них відносяться способи комплексної терапії, що базуються на використанні гормональних та негормональних імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних препаратів, антикоагулянтів та антиагрегантів [див. А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. – М.: 1999. – т. 2. – с. 137-146].

Недоліком цих способів є недостатня їх ефективність, що призводить до раннього виникнення серцево-судинних ускладнень. Останньому сприяє ендотеліальна дисфункція, яка являється одним з патогенетичних механізмів розвитку атеросклерозу.

В основу корисної моделі поставлене завдання розробити такий спосіб лікування, який би знижував можливість розвитку атеросклерозу у хворих на СЧВ.

Таке завдання забезпечується тим, що на фоні комплексної терапії (гормональні і негормональні

імунодепресанти, амінохінолонові похідні, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти, антиагреганти) хворому призначають предуктал MR по 1 т. 2 рази на добу.

Застосування способу. Хворому на системний червоний вовчак поряд з режимом, дієтою, імунодепресантами, амінохінолоновими похідними, нестероїдними протизапальними препаратами, антикоагулянтами, антиагрегантами призначають предуктал MR по 1 т. 2 рази на добу.

Конкретний приклад застосування способу. Хвора Ш., 38 років, поступила в клініку з діагнозом: системний червоний вовчак, акт. Іст., хронічний перебіг, атеросклеротичний міокардіосклероз НІ. Призначено лефлуномід по 20мг на добу, плаквеніл 400мг на добу, індометацин по 1т. 2 рази на добу. Проведене лікування покращило стан хворої, однак залишалися біль в області серця та задишка. Додатково призначено предуктал MR по 1т. 2 рази на добу. Лікування продовжено амбулаторно. Через 7 днів біль і задишка пройшли. Профілактично рекомендовано застосування предукталу у вказаній дозі курсами по 2 місяці 2 рази на рік.