



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **39501** (13) **U**
(51) **МПК (2009)**
A61N 1/10
A61B 17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНСУЛЬТУ

1

(21) u200812568
(22) 27.10.2008
(24) 25.02.2009
(46) 25.02.2009, Бюл.№ 4, 2009 р.
(72) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, UA
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, UA

2

(57) Спосіб лікування інсульту, який включає медикаментозні засоби, кінезотерапію, масаж, який **відрізняється** тим, що в ранньому відновному періоді в комплекс медикаментозних засобів включають есенціале форте по 10 мл внутрішньовенно 1 раз на день протягом 14 днів, а потім по 2 капсули 3 рази в день протягом 3 місяців.

Запропонований спосіб лікування інсульту відноситься до медицини, зокрема до неврології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні інсульту в ранньому відновному - до 6 місяців - періоді.

Способи лікування інсульту в ранньому відновному періоді відомі. До них відносяться медикаментозні засоби (церебралізін, солкосерил, токоферол-ацетат, кавінтон, інстенон, танакан, мідокалм), кінезотерапія, масаж [див. В.Д. Трошин, А.В. Густов, О.В. Трошин. Острые нарушения мозгового кровообращения. -М.: 2000. - С. 288-318]. Однак перераховані способи не передбачають раннє відновлення провідності нервової тканини.

В основу корисної моделі поставлена задача розробки такого способу, який би сприяв якомога ранньому відновленню провідності нервової тканини.

Така задача забезпечується тим, що в комплекс медикаментозних засобів включають есенціале форте по 10мл внутрішньовенно на аутокрові 1 раз на день на протязі 14 днів, а потім по 2 капсули 3 рази в день на протязі 3 місяців.

Застосування способу. Після виведення хворого з гострого періоду йому призначають церебралізін, солкосерил, токоферол-ацетат, кавінтон, інстенон, танакан, мідокалм, кінезотерапію, масаж. Поряд з цим дають есенціале форте по 10мл внутрішньовенно на аутокрові 1 раз на день на протязі 14 днів, а потім по 2 капсули 3 рази в день на протязі 3 місяців.

Конкретний приклад застосування способу. Хвора К., 48 років, поступила в клініку з діагнозом гостре порушення мозкового кровооту (ГПМК) у вертебро-базиллярному басейні. Призначені реополіглюкін, кавінтон, пентоксифілін, гепарин, німодипін. На 18-й день після завершення гострого періоду призначено церебралізін, солкосерил, токоферол-ацетат, кавінтон, мідокалм, кінезотерапію, масаж, есенціале форте по 10мл внутрішньовенно на протязі 14 днів, а потім по 2 капсули 3 рази на день.

Через 6 місяців після ГПМК відмічено повне відновлення втрачених функцій.

Таким чином, запропонований спосіб дозволяє досягти раннього відновлення втрачених функцій.