



УКРАЇНА

(19) UA (11) 39773 (13) U
(51) МПК (2009)
A61B 17/00
A61N 1/10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ МОЗКОВОГО КРОВОТОКУ

1

(21) u200812210
(22) 16.10.2008
(24) 10.03.2009
(46) 10.03.2009, Бюл.№ 5, 2009 р.
(72) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, UA
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ,
UA

2

(57) Спосіб лікування хронічної недостатності мозкового кровотоку, який включає нейротрофіки, вазоактивні препарати, ноотропи, препарати, що покращують реологічні властивості крові, який відрізняється тим, що хворому призначають гептрал по 200мг внутрішньовенно крапельно протягом двох тижнів, а потім по 2-3 таблетки на день ще протягом двох тижнів.

Запропонований спосіб лікування хронічної недостатності мозкового кровотоку відноситься до медицини, зокрема до неврології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хронічної недостатності мозкового кровотоку.

Способи лікування хронічної недостатності мозкового кровотоку відомі. До них відноситься комбінована терапія із застосуванням нейротрофіків, вазоактивних препаратів, ноотропів і препаратів, що покращують реологічні властивості крові [див. Н.Е.Иванова, В.С.Пакунцев. Опыт применения винпотропила при хронической ишемии мозга. Український медичний часопис. -2004.-6/44.-С.5-12].

Але вказаний спосіб має недоліки, оскільки недостатньо впливає на якість трофічних процесів в тканинах мозку.

В основу корисної моделі поставлена задача розробки більш ефективного і доступного способу, який би більш активно впливав на якість трофічних процесів в тканині мозку.

Така задача забезпечується тим, що хворому поряд з нейротрофічними, вазоактивними препаратами, ноотропами і препаратами, що покращу-

ють реологію крові, дають щоденно гептрал (адemetонін) по 200мг внутрішньовенно крапельно на протязі двох тижнів, а потім ще на протязі двох тижнів по 2-3 таблетки на день.

Застосування способу. Хворому з хронічною недостатністю мозкового кровотоку призначають нейротрофіки, вазоактивні препарати, ноотропи, препарати, що покращують реологічні властивості крові, і гептрал по 200мг.

внутрішньовенно крапельно на протязі двох тижнів, а потім ще на два тижні по 2-3 таблетки в день.

Конкретний приклад застосування способу.

Хворий М., 55 років, поступив в клініку з явищами хронічної ішемії мозку після перенесеного інсульту. Призначено циннаризин по 75мг, кавінтон по 15мг, церебролізін по 20мл внутрішньовенно, тиклопідін по 250мг 2р. на добу, пентоксифілін по 0,05 внутрішньовенно крапельно. Через 10 днів стан хворого не покращився. Призначено гептрал по 200мг внутрішньовенно крапельно на протязі двох тижнів, а потім ще на два тижні по 2-3 таблетки в день. Після закінчення лікування досягнута стійка ремісія.