



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **39774** (13) **U**  
(51) **МПК (2009)**  
**A61B 17/00**  
**A61N 1/10**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під  
відповідальність  
власника  
патенту

### (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

1

(21) u200812211  
(22) 16.10.2008  
(24) 10.03.2009  
(46) 10.03.2009, Бюл.№ 5, 2009 р.  
(72) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, UA  
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-  
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ,  
UA

2

(57) Спосіб лікування ревматоїдного артриту, який включає протизапальні, базисні засоби, імунопротектори, фізіотерапію, ЛФК, який **відрізняється** тим, що призначають гептрал по 200мг внутрішньовенно крапельно протягом двох тижнів, а потім по 2-3 таблетки на день ще протягом двох тижнів.

Запропонований спосіб лікування ревматоїдного артриту (РА) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих з РА та загостреннями деформуючого артрозу.

Способи лікування ревматоїдного артриту відомі. До них відносяться протизапальні, базисні засоби, імунопротектори, фізіотерапія, ЛФК [див. А.Н. Огороков. Лечение болезней внутренних органов. М., 1998. - т. 2. - С. 25-85].

Але перераховані способи недостатньо ефективні, внаслідок чого через короткий проміжок часу настає рецидив загострення.

В основу винаходу поставлена задача розробки більш ефективного способу, який би дозволив досягти стійкої ремісії.

Така задача забезпечується тим, що крім протизапальних, базисних засобів, імунопротекторів, фізіотерапії і ЛФК хворому щоденно дають гептрал (адemetіонін) по 200мг внутрішньовенно крапельно на протязі двох тижнів, а потім на протязі ще двох тижнів по 2-3 таблетки на день.

Застосування способу. Після поступлення хворого поряд з протизапальними, базисними засобами, імунопротекторами, фізіотерапією і ЛФК призначають гептрал по 200мг внутрішньовенно крапельно на протязі двох тижнів, а потім на по 2-3 таблетки на день ще на протязі двох тижнів.

Конкретний приклад застосування способу. Хвора Н., 45 років, поступила в клініку з діагнозом РА, поліартрит, активність I, серо (-). Порушення функції суглобів I-II ступеня. Призначено базисну терапію, яка включала застосування сульфасалазину 1500мг на добу, німесулід 200мг на добу, тималіну по 10мг внутрішньом'язово 1 раз на добу, фізіотерапію і ЛФК. Оскільки через 2 тижні ефекту не було, призначено гептрал по 200мг внутрішньовенно крапельно на протязі 2 тижнів, а потім по 2-3 таблетки на день на протязі двох тижнів. Через 7 днів ознаки загострення пройшли. Закінчено призначений курс лікування. Хвора виписана зі стійкою ремісією.

Комп'ютерна верстка Л. Купенко

Підписне

Тираж 28 прим.

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

(13) **U**  
(11) **39774**  
(19) **UA**