



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **54088** (13) **U**  
(51) **МПК (2009)**  
**A61K 31/00**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під  
відповідальність  
власника  
патенту

### (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

1

2

(21) u201005223

(22) 29.04.2010

(24) 25.10.2010

(46) 25.10.2010, Бюл. № 20, 2010 р.

(72) ШЕВЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(73) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ЛІКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС) ВІННИЦЬКОГО НА-

ЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.І. ПІРОГОВА

(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, що включає режим, дієту, призначення глюкокортикостероїдів, імунодепресантів, нестероїдних протизапальних засобів, антикоагулянтів, який **відрізняється** тим, що хворому призначають додатково детралекс по 250 ЛПЛ/од. 2 рази на добу протягом місяця.

Спосіб лікування системного червоного вовчака (СЧВ) належить до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на системний червоний вовчак з супутнім антифосфоліпідним синдромом (АФЛС).

Способи лікування СЧВ відомі. До них відноситься спосіб С.В. Шевчука (Декларційний патент на корисну модель №4315. - Бюл. №1, 2005). Суть способу полягає в застосуванні на фоні базисної терапії (режим, дієта, глюкокортикостероїди, імунодепресанти, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти) ериніту по 10мг 4 рази на добу. Спосіб дозволяє зняти спазм судин, покращити рухи в суглобах та загальний стан хворого.

Недоліком способу є майже повна відсутність ефекту у хворих на СЧВ з супутнім АФЛС і порушеннями мікроциркуляції.

В основу корисної моделі поставлене завдання розробити такий спосіб лікування, який усуває порушення мікроциркуляції.

Таке завдання забезпечується тим, що на фоні базисної терапії системного червоного вовчака (режим, дієта, глюкокортикостероїди, імунодепресанти, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти) хворому дають детралекс по 250 ЛПЛ/од.

2 рази на добу протягом місяця. Клінічний ефект починає проявлятися вже на 5-6 добу, проходять набряки кінцівок, відмічається їх потепління, зникає біль.

Застосування способу. Хворому на системний червоний вовчак з супутнім АФЛС поряд з режимом, дієтою, глюкокортикостероїдами, імунодепресантами, нестероїдними протизапальними препаратами, антикоагулянтами щодня дають детралекс по 250 ЛПЛ/од. 2 рази на добу протягом місяця.

Конкретний приклад застосування способу. Хвора М., 29 років, поступила в клініку з діагнозом: СЧВ, акт. ІІст., хронічний перебіг, поліартрит, синдром Рейно, вторинний АФЛС.

Призначено преднізолон 25мг на добу, вольтарен, плаквеніл, гепарин, трентал. Загальний стан хворої дещо покращився, однак залишались симптоми порушення венозної мікроциркуляції. Додатково призначено детралекс по 250 ЛПЛ/од. 2 рази на добу. Покращення відмічалось вже на 4-й день. Зменшились набряки нижніх і верхніх кінцівок, пройшов біль, зникла скутість в суглобах. В подальшому стан хворої покращувався. Виписана додому на 12-й день зі стійким результатом.

Комп'ютерна верстка А. Рябко

Підписне

Тираж 26 прим.

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

(13) **U**  
(11) **54088**  
(19) **UA**