



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 59600

(13) A

(51) 7 A61B17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІОПИС  
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ  
НА ВИНАХІДВИДАЄТЬСЯ ПІД  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ВЛАСНИКА  
ПАТЕНТУ

## (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПОЛІНЕВРИТІВ

1

2

(21) 2002107891

(22) 04 10 2002

(24) 15 09 2003

(46) 15 09 2003, Бюл. № 9, 2003 р.

(72) Шевчук Сергій Вікторович

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-  
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

(57) Спосіб лікування поліневритів, що включає призначення десенсибілізуючих засобів, імунодепресантів, судинних препаратів, метаболітів, електростимуляцію, який **відрізняється** тим, що як лікувальну речовину застосовують араву (лефлуномід) по 100 мг перші три дні і по 20 мг в наступні до вилікування поліневрити

Запропонований винахід відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні поліневропатій, особливо при дифузних захворюваннях сполучної тканини вузловому периартерії, системному червоному вовчаку, склеродермії.

Способи лікування поліневритів відомі. До них відноситься етіотропна і антиалергічна терапія (див. Я. Ю. Попелянский. Болезни периферической нервной системы — М., Медицина, — 1989, С. 238-239). При цьому крім десенсибілізуючих застосовують імунодепресанти, засоби, що покращують трофіку стінок судин, препарати, що покращують кровопостачання скелетних м'язів, метаболіти, магніто-терапію, електростимуляцію, ін'єкції прозерину, електрофорез лікарських засобів.

Недоліком описаного способу є тривале лікування і недостатня його ефективність, що проявляється переходом процесу в хронічний перебіг.

В основу запропонованого способу поставлена задача підвищення ефективності лікування. Ця задача забезпечується тим, що хворим призначають араву (лефлуномід) перші три дні по 100 мг, а наступні — по 20 мг внутрішньо до проходження клініки поліневрити.

Застосування способу. Після встановлення

діагнозу ураження периферійного нерву і, поліневрит, полінейропатія) хворому призначають араву (лефлуномід). В перші три дні препарат дають по 100 мг один раз на добу, а в наступні — по 20 мг щоденно один раз на добу до проходження явищ поліневрити.

Конкретний приклад застосування способу

Хворий К., 33 років, поступив в клініку з приводу вовчакової поліневропатії, яка проявлялась парестезіями, болем, зниженням больової, температурної, тактильної і вібраційної чутливості, онімінням ступнів, пекучістю в стопах. Відмічались парези маломіжкових нервів, атрофія м'язів ніг. Хворому призначено араву (лефлуномід) перші 3 доби по 100 мг, а в наступні — по 20 мг на добу. Динаміка клінічного перебігу почала з'являтися на 14 добу лікування. Зменшувались біль і печія в ступнях, їх оніміння. Поступово, до 26 доби, підвищились всі види чутливості. Явища парезу маломіжкових нервів зменшувались, що проявлялось збільшення рухів і чутливості. На 43-44 дні явища парезів практично не відмічались. Зменшилась атрофія м'язів. Хворий виписаний на амбулаторне лікування. Оглянутий через два місяці зберігається стійкий позитивний результат.

Комп'ютерна верстка В. Рябиця

Підписано до друку 06 10 2003

Тираж 39 прим.

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м. Київ, МСП, 04655, Україна

ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул. Артема, 77, м. Київ, 04050, Україна

(13) A  
(11) 59600  
(19) UA