



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **14768** (13) **U**  
(51) **МПК (2006)**  
**A61B 17/42**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС

### ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під  
відповідальність  
власника  
патенту

**(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПУХЛИНОПОДІБНОГО УРАЖЕННЯ ПРИДАТКІВ РУДИМЕНТАРНОГО РОГУ МАТКИ**

1

2

(21) u200512834

(22) 30.12.2005

(24) 15.05.2006

(46) 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р.

(72) Вовк Ірина Борисівна, Корнацька Алла Григорівна, Кондратюк Валентина Костянтинівна

(73) ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ

**(57)** Спосіб хірургічного лікування пухлиноподібного ураження придатків рудиментарного рогу матки шляхом видалення рудиментарного рогу матки з гематосальпінксом, який **відрізняється** тим, що проводять видалення пухлиноподібного ураження яєчника в межах здорової тканини з наступним його формуванням з можливістю забезпечення умов для фізіологічного функціонування матки та яєчників.

Спосіб корисної моделі відноситься до галузі медицини, зокрема гінекології, і може бути використаний для підвищення ефективності оперативного втручання у пацієнок з пухлиноподібним ураженням придатків рудиментарного рогу матки.

Для оперативного лікування пацієнок з пухлиноподібним ураженням придатків рудиментарного рогу матки, застосовують спосіб суть якого полягає у видаленні уражених придатків рудиментарного рогу [К.Балдвин, 1904].

Дана операція має ряд недоліків: рецидиви гематометри рудиментарного рогу.

Найближчим, за технічною суттю, способом хірургічного лікування пухлиноподібного ураження придатків рудиментарного рогу матки з пухлиноподібними ураженнями придатків, є спосіб видалення уражених придатків разом з рудиментарним рогом [І.І. Богоров, 1960; Ю.А.Гуркин, 2000].

Недоліками вказаного способу є виникнення пухлиноподібного ураження залишеного яєчника.

В основу корисної моделі способу хірургічного лікування пухлиноподібного ураження придатків рудиментарного рогу матки поставлено задачу створення умов для неускладненого функціонування матки та яєчників за рахунок видалення рудиментарного рогу матки з гематосальпінксом, та видалення пухлиноподібного ураження яєчника в межах здорової тканини з наступним його формуванням з метою забезпечення повноцінного функціонування матки та яєчників, що дасть змогу покращити якість життя пацієнтки, уникнути інвалідизації, перспективу материнства.

Поставлена задача способу хірургічного лікування пухлиноподібного ураження придатків ру-

диментарного рогу матки вирішується шляхом видалення рудиментарного рогу матки з гематосальпінксом та видалення пухлиноподібного ураження яєчника; згідно корисної моделі додатково проводиться видалення пухлиноподібного ураження яєчника в межах здорової тканини з наступним його формуванням; залишений функціонуючий яєчник, попереджує виникнення порушень репродуктивної функції у даного контингенту пацієнок.

Суть способу, що заявляється підтверджується наступними прикладами.

Приклад 1. Хвора 3., 14 років.

Діагноз: Аномалія розвитку внутрішніх статевих органів. Гематометра, гематосальпінкс рудиментарного рогу матки, ендометріодна кіста яєчника.

Проведене хірургічне лікування запропонованим способом. Тривалість оперативного втручання 1 година 25 хвилин. На 8 добу в задовільному стані виписана додому.

Приклад 2. Хвора Ю., 13 років.

Діагноз: Аномалія розвитку внутрішніх статевих органів. Гематометра, гематосальпінкс рудиментарного рогу матки, фолікулярна та ендометріодна кісти яєчника.

Проведене хірургічне лікування запропонованим способом. Тривалість оперативного втручання 1 година 20 хвилин. Післяопераційний період протікав без ускладнень. На 7 добу в задовільному стані пацієнтка виписана додому.

Дане оперативне втручання проводиться в спеціалізованих стаціонарах.

(13) **U**

(11) **14768**

(19) **UA**

