



УКРАЇНА

(19) UA (11) 16928 (13) U
(51) МПК (2006)
A61K 33/00
A61K 33/18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СНІДу

1

(21) 99042032
(22) 09.04.1999
(24) 15.09.2006
(46) 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р.
(72) Павлюк Олена Олександрівна
(73) Стависюк Ганна Всеволодівна
(57) 1. Спосіб профілактики СНІДу, який передбачає прополіскування носоглотки засобом, який містить наступні компоненти: розчин йоду 5%

2

спиртовий 6-7 крапель, сіль кухонна 2,5 г, вода 0,5л.
2. Спосіб профілактики СНІДу за п. 1, в якому зазначений засіб додатково приймають перорально 2 рази на добу перед їжею.
3. Спосіб профілактики СНІДу за п. 1 або 2, в якому зазначеним засобом додатково проводять гігієнічні промивання статевих органів.

Корисна модель відноситься до медицини, зокрема, до онкології, гінекології, пульмонології, лор і може бути використана при лікуванні та профілактиці, спочатку як вірус СНІДу потрапляє до крові, це, зокрема, відноситься як до ВІЧ-1, так і до ВІЧ-2.

Наукові медичні працівники майже у всьому світі покладають багато зусиль, щоб знешкодити вірусу, але вони анамнез хвороби починають рахувати з того часу, як знаходять антитіла, а хвороба починається значно раніше. Отже, їх праця може тому і не вінчається успіхом, що вони знову не подумали про причину - 1 появи хвороби.

А причина майже криється в анамнезі хвороби, з нього витікає, що вона протікає слідуочим шляхом, спочатку захворює людина на запалення легенів раз 7 або 8, а потім виникає рак статевих органів.

(Про це мені повідомила Стависюк Галина Всеволодівна, яка зателефонувала до м.Еліста, де були діти, які перші захворіли на СНІД). Вона запитала у головного лікаря цієї установи як протікає хвороба і попросила його взяти у пробірку кілька крапель крові у дітей зі СНІДом та обробити її нашим антисептиком, бо знала, що цей вірус СНІДу має дуже сильну капсулу. Але лікар з м.Еліста відповів, що цього він зробити не може, бо вірусу СНІДу в чистому вигляді не існує на планеті взагалі, а тільки антитіла. Це було у 1984 році.

Тому попередній висновок з анамнезу ми зробили так, що СНІД треба лікувати двома ступенями поступово. Перше - вилікувати запалення легенів, а потім - рак статевих органів. Отже, двома

ступенями йде анамнез хвороби, (тобто протікає), тому ф двома ступенями її треба лікувати.

Але, якщо брати запалення легенів, бронхів та бронхіальну астму, запалення гландів, а спочатку перед цими хворобами виникає синусит, гайморит, фронтит - це все одна причина стафілокок, який потрапляє до дихальних шляхів з повітря і потрапляє до універсального осередку інфекції. Запалення легенів ця методика лікує за 2-3 тижня, а рак за 3 місяці, теж враховуючи ступень хвороби. Це було в моїй заявці по лікуванню раку [заявка №98052656].

Нормальна формула крові після лікування моїм антисептиком в стаціонарі фахівцями-лікарями це доведе. Якщо Ви зробите експертизу по суті, перше, що мені хотілось би довести слідуоче: поява антитіла може бути тільки в разі інфекції організму. Отже, скоріше всього, що лікарі і знайшли антитіла, які виробляють клітини людини проти стафілококу, синьогнійної палички та туберкульозної палички. Отже, віруси грипу, СНІДу не виробляють гній в організмі, а тільки стафілококи, патогенні та золотисті, спричиняють це насамперед.

Але ми маємо справу на кінці анамнезу СНІД (передсмертна стадія - рак). Так от, при біопсії, взятої мною кілька років тому, виявлений St при мазку із пазух носу великий зріст стафілококу золотистого та патогенного, тобто гній. Отже, причина - в стафілококах насамперед, а не в чомусь іншому. Тобто, стафілокок-база дає можливість вірусу СНІДу потрапити до ослабленого організму людини і там починається проникнення його у кров, як у дітей, так і у дорослих.

UA (11) 16928 (13) U

І друге, що хочу довести на схожість СНІДу та стафілококів - це спадкоємність, так само і стафілококи передаються по спадкоємності.

По висновкам і фотографіям та дослідницьким журналам модель вірусу імунодефіциту людини має капсулу і може вар'їрувати в кожному організмі по різному. Це і ставить вчених у тупік.

Моя задача в тому і була, що мені треба було знайти такий спосіб, щоб не допустити цього. І він є. Така стадія не буде, бо він (вірус) знешкоджується при надходженні до організму на 1-й та вже 2-й хвилині. Це буде і зі всіма іншими вірусами, бо так було з капсулою сибірської язви.

Якщо брати взагалі процес, це біду протікати таким чином: вірус проб'є йодно-сольовий розчин і обутлення буде дуже швидко.

Зважаючи на данні, які надходять до нас по радіо і телебаченню, можна зробити ще один висновок, що лікарі, які спочатку вважали, що СНІД розповсюджується тільки статевим шляхом, помилковий. Поширення СНІДу серед людей, які ведуть пристойний, а не антиморальний образ життя це підтвердило. А між тим, за прогнозом ВООЗ, до 2000 року кількість інфікованих досягне 40 мільйонів, де з них до 10 мільйонів - серед дітей (це дані за 1995 рік, зараз ці цифри зростають).

Вакцини, які вже почали виробляти у США, успіху не дадуть тому, що не знешкоджується осередок інфекції, при контрацептивах також.

Поставлене завдання по профілактиці СНІДу вирішується таким чином:

Хворому призначають:

1. Прополіскування носоглотки, яке роблять з розрахунку до 0,5л води кімнатної температури додають 8%-солі хлориду натрію, 6-7 крапель 5% спиртового розчину йодною настоянки (екстемпере).

2. Прийом внутрішньо до їжі двічі на день.

3. Гігієнічні промивання статевих органів антисептиком по формулі. Для жіночої статі обов'язково зі спринцюванням раз на тиждень. Для чоловіків опускання пенісу на 1-2 хвилини до розчину по формулі, при затримках мочі на 3-4 хвилини, температура кімнатна (екстемпере). Дітям треба робити орошення, починаючи з народження, спринцювання по формулі антисептика, з послідовним обливанням теплою водою, або гарячою. Приклади:

- Саша - анонімно звернувся через телебачення. На прийомі при об'єктивному огляді виявлено розбуків'я лівої стопи сугавів; хриплі звуки з лівого бронху; часто до СНІДу хворів на ОРЗ по 2-3 рази на два тижні, бронхіти, пневмонію, покинув

роботу; температура 37,2°C - 37,9°C суфібрильна майже завжди; артеріальний тиск 90х60 PS-110'; важко ходить, завжди болить голова. СНІД виявлено, коли йому є 25 років. З народження до цього віку він хворів. Імунітет завжди був поганий, якщо хворів і немовля. Рак статевих органів з'явився після запалення мочевики та жовчного міхура.

- Наташа - робітник анонімного центру по СНІДу (Львівська площа); захворіла на СНІД у 23 роки; заміжня, має дитину, дуже морально вихована людина, медична сестра. Картина в анамнезі така сама, як і у попередньому випадку, тільки тиск та температура інша AD 160х70, t=39,5°C.

- Люба - захворіла на СНІД у 30 років; веде морально-стійкий образ життя - не п'є, не палить, чоловіка дуже кохає і зрадити не змогла би ні в якому разі (тільки, якщо у випадку згвалтування); чоловік теж дуже порядна людина. Люба знаходиться на лікуванні СНІДу у снідовому центрі вже 3 місяці. Картина в анамнезі точно така, як у випадку з Наташею, тільки ще й запалення бронхів та легенів. Запалення по-жіночому почалося за 5 місяців з ерозії; по її словам дитина теж часто хворіє на ОРЗ, після 3-х місяців у нього теж з'явилися ознаки ослаблення імунної системи. З цього всього робимо висновок; спочатку запалення - потім СНІД.

- Тетяна - 31 рік; діагноз: рак; до раку статевих органів хворіла на ОРЗ, бронхіти, головні болі, синусит, потім запалення по-жіночому, рак грудей, рак лімфотичного вузла, вагіни. Отже, з анамнезу видно де початок і з чого. Лікувалась у мене 3 місяці. Результат вражає. Потім покинула лікування. Зараз здорова.

Отже СНІД не виникає на пустому місці, а на базі стафілокової інфекції і тільки, та ще організм виснажується боротьбою з іншими вірусами та мікробами, хоча небезпечнішого ніж стафілокок вже немає і не буде. Тому очищення від смертельно небезпечного стафілококу залишається самим важливим для того, щоб діагноз СНІД зник; а діагноз: рак вульви, рак вагіни, саркома вульви, рак шийки матки, рак тіла матки, рак маточної труби, саркома матки, рак яєчників, теретабластома, рак Крукенберга, пухирний занос, хориопітеліома, рак простати, туберкулома та інші не дуже і з "являться, якщо не дати інфекції зелену вулицю до організму.

Висновок - антисептик, який має не шкідливі речовини, наче локатор вловлює мікроби і знешкоджує їх на шкірі людини та всередині статевих органів і всього організму взагалі, не дає знаходитись в організмі людини.