



УКРАЇНА

(19) UA (11) 33334 (13) U
(51) МПК (2006)
A61K 36/00
A61P 37/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

1

2

(21) а200704779

(22) 28.04.2007

(46) 25.06.2008, Бюл.№ 12, 2008 р.

(72) ХАРЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, UA

(73) ХАРЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, UA

(57) Спосіб лікування ВІЛ-інфекції, який відрізняється тим, що установлюють чіткий режим споживання їжі, їжу не приймають після 19⁰⁰ години, а перерву між прийняттям їжі установлюють не менше ніж чотири години, за дев'яносто хвилин до прийняття їжі та перед сном випивають півсклянки теплого молока, в яке додають 15-20 капель 20-30% спиртової витяжки прополісу, за одну годину до прийняття їжі та перед сном випивають півсклянки молочної сироватки, за тридцять хвилин до прийняття їжі та перед сном приймають одну чайну ложку суміші, яку готують в % співвідношенні по масі: мед 80-86, 20-30% спиртова витяжка прополісу 10-7, кукурудзяне або обліпихове масло 10-7, після прийняття їжі та перед сном випивають півсклянки теплої кип'яченої води, в якій

розчиняють одну ложку меду і чотири чайних ложки фруктово-ягідного оцту, після цього жують 6-9 г сотового меду, через день протягом тижня в воду з медом та фруктово-ягідним оцтом додають одну краплю йоду та п'ють перед сном, протягом другого тижня краплю йоду додають два рази на тиждень, йод приймають доки не з'явиться зайвий слиз у носі, протягом першого, четвертого та п'ятого тижнів один раз на тиждень тіло обгортають вологою льняною тканиною та лягають у постіль на 1-2 години та тепло вкриваються, після цього тіло обмивають прохолодною водою протягом 1-2 хвилини, а потім тепло одягаються, протягом другого та третього тижнів обгортання тіла роблять два рази на тиждень, протягом четвертого та п'ятого тижнів - один раз на тиждень, а один раз на тиждень приймають баню з вологим повітрям 70-80 % і температурою повітря 60-65 °С протягом 15-20 хвилин, спосіб лікування застосовують протягом двох місяців, а при важкій формі захворювання - до шести.

Галузь застосування лікування ВІЛ-інфекції є медицина та сам хворий.

Найбільший за сукупністю ознак лікування ВІЛ-інфекції є комбіноване лікування трьох або чотирьох ВААРТ [Люди и ВИЧ, Киев 2004г., стр. 289, 290 міжнародний Альянс].

Причини, які перешкоджають одержанню результату є те, що цей спосіб лікування направлений проти самого вірусу імунodefіциту. Цей спосіб не передбачає виділення з крові знешкоджених вірусів і пошкодженої крові, не поповнює організм та кров хворого вітамінами, мікроелементами і не відновлює імунної системи організму. В основу способу поставлено задачу знешкоджувати ВІЛ-інфекцію та її збудників, виділяти їх і пошкоджену кров на поверхню тіла та змивати їх з поверхні, поповнювати кров вітамінами та мікроелементами, збільшувати число глобулінів у крові, таким чином підвищити фагоцитизм організму, та відновити імунну систему організму, котрий в подальшому

буде захищати організм від ВІЛ-інфекції та її збудників.

Суть цього способу полягає в тому, що ВІЛ-інфекцію знешкоджувати вологим повітрям 70-80% і температурою 60-65°C, медом, прополісом, фруктово-ягідним оцтом, йодом знешкоджувати шкідливі бактерії, токсини які є збудниками ВІЛ-інфекції, знешкоджених збудників та пошкоджену кров водою, виділяти на поверхню тіла та змивати їх з поверхні тіла, медом, фруктово-ягідним оцтом, бджолиним воском поповнювати кров вітамінами та мікроелементами, молочною сироваткою, збільшувати число глобулінів, котрі знешкоджують ВІЛ-інфекцію, медом прополісом підвищити фагоцитизм організму, таким чином відновити імунну систему організму, котрий в подальшому буде захищати організм від інфекції та її збудників. Суть цього способу полягає ще в тому, що:

- не спричиняє сторонніх захворювань,
- не зашкоджує здоров'ю,

(13) U

(11) 33334

(19) UA

- не потребує складного медичного обладнання та препаратів,
- вилікуватись може сам хворий,
- ефективно на 60%.

Відомості, які підтверджують здійснення способу.

Можливість здійснення суті та результату полягає в тому, що здорова імунна система організму знешкоджує ВІП-інфекцію, шкідливі бактерії, токсини, а якщо в організмі ослаблена імунна система іншими інфекціями, шкідливими бактеріями, токсинами і вірусами, то організм стає беззахисним, йому потрібно допомагати, щоб шкідливі бактерії не потрапляли в організм, а якщо вони потрапили в нього, знешкоджувати їх в організмі.

Для цього потрібно встановити чіткий режим споживання страви. Страву приймати в один і той же час. Перерва між прийняттям їжі не повинна бути меншою ніж чотири години, а після 19-00 їжу не приймати. Страву не переварювати, добре пережовувати, із-за столу вставати з легким відчуттям недоїдання. Не вживати вареного тіста, м'яса, сала, цукор замінити медом, менше вживати солі. Не палити. Не вживати міцних спиртних напоїв. Не вживати припорчених продуктів, овочів та фруктів. Не вживати копчених, консервованих продуктів харчування, продуктів, які містять токсини, копчену, в'ялену, мариновану рибу, каву, чай. [И.М. Скурихин, Москва 1991г., стр. 86,87. Воё о пище с точки зрения химика].

Вживати хліб житній, яйця, молоко, мед, сир не солоний, масло кукурудзяне та коров'яче, морську рибу крупи, картоплю, овочі, фрукти інші продукти харчування, які швидко перетравлюються та не містять токсинів, за 90хв. до прийняття їжі та перед сном випити пів склянки теплого молока, в яке додати 15-20 крапель 20-30% витяжки прополісу [Мёд и мёдолечение, Стоймир Младенов, 1972г. стр. 211].

За одну годину до прийняття їжі та перед сном випити пів склянки молочної сироватки [Биохимия, Д.Л. Фредман, Москва 1962г. стр. 537]. За 30хв. до прийняття їжі та перед сном прийняти одну чайну ложку суміші меду, 20-30% витяжки прополісу, кукурудзяного або обліпихового масла. Суміш приготувати в % співвідношенні по масі:

1. Мед	-80-86
2. 20-30% витяжки прополісу	-10-7
3. Кукурудзяне або обліпихове масло	-10-7
	100-100

[Мёд и мёдолечение, Стоймир Младенов, 1972 г. стр. 68,69,173,174. Люди ВИЧ стр. 315].

Після прийняття їжі та перед сном випити півсклянки теплої кип'яченої води в якій розчинити одну чайну ложку меду і чотири чайних ложки ф'я оцту, після цього жувати 6-9 грамів сотового меду. [Биохимия, Д.Л. Фредман, Москва 1962г., стр. 119. Мёд и мёдолечение, Стоймир Младенов, 1972г. стр. 205, 206. Энциклопедический справочник медицины и здоровье, стр. 918].

Через один день протягом тижня в воду з медом і фруктовим оцтом додавати одну каплю йоду, пити перед сном. На протязі другого тижня каплю йоду додавати через два дні, в подальшому каплю йоду додавати два рази на тиждень. Йод приймати поки не з'явиться зайва слизь у носі [Д.С. Джарвис, стр. 115, 116, 117, Мёд и другие естественные продукты, Киев 1991г.].

Протягом першого тижня один раз на тиждень прийняти душ, тіло вимити слаболужним милом, після душу тіло обгорнути в вологу льняну тканину, яку намочити у воді та викрутити від зайвої води, лягти у постіль, тепло вкритись, щоб не було доступу повітря, таким чином зігрівати тіло протягом однієї-двох годин, приваблювати кров до поверхні тіла і через відкриті пори шкіри разом з потом виділяти пошкоджену кров, знешкоджені бактерії, токсини, після цього прийняти прохолодний душ і змити виділення з тіла, тепло одягтись та лягти в ліжку.

Обмивання тіла та одягання робити протягом однієї-двох хвилин, щоб не застудитись. Цю процедуру робити перед сном. Протягом другого тижня і третього обгортання тіла робити два рази на тиждень. Протягом четвертого і п'ятого тижня обгортання тіла робити один раз на тиждень, та один раз на тиждень прийняти баню протягом 15-20хв. з температурою повітря 60-65°C і вологістю повітря 70-80% [Люди и ВИЧ, Международный альянс, 2004г. стр.12, С.Кнайпп, стр. 21, 109, 110].

Спосіб лікування застосовувати протягом двох місяців, а при важкій формі захворювання до шести місяців. Не застосовувати спосіб лікування людям, у котрих є обмеження в харчовому раціоні вуглеводів і котрі не можуть приймати мед.

„Отож, мої любі, мавши ці обітницї, очистьмо себе від усякої нечисти тіла та духа” [Апостол Павел, 2 Коринт. 7:1].