



УКРАЇНА

(19) UA (11) 34950 (13) A

(51) 6 A61K35/78

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВІНАХІДвидається під
відповідальність
власника
патенту(54) ЗАСІБ, ЩО ВОЛОДІЄ ПРОНОСНИМ ЕФЕКТОМ, ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
КИШЕЧНИКА

(21) 99074226

(22) 21.07.1999

(24) 15.03.2001

(46) 15.03.2001, Бюл. № 2, 2001 р.

(72) Карамішев Дмитро Васильович

(73) КАРАМИШЕВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

(57) Засіб, що володіє проносним ефектом, для лікування запальних захворювань кишечника, який включає відвар кори жостеру, водний настій м'яти, що відрізняється тим, що водний настій м'яти готують разом з кмином, а склад засобу додатково

містить спиртовий настій вовчуга, масло касторове та ароматизатор при наступному співвідношенні компонентів, мл:

відвар кори жостеру – 200;

водний настій м'яти та кмину – 200, при цьому беруть 50 г м'яти та 20 г кмину на 1 стакан (200 г) кип'ячої води.

спиртовий настій вовчуга (готова форма) – 50;

масло касторове – 50;

ароматизатор – 2–3 краплі.

Винахід належить до медицини, зокрема до гастроентерології, та може бути використано у стаціонарних та амбулаторних умовах.

Відомий засіб, що володіє проносним ефектом, (дивись М.Д. Мошковський – Лекарственные средства. – 1994. – ч. 1, с. 325–333), – прототип, який містить збір із відвару кори жостеру, водного настою м'яти, валеріани, айру.

Недоліком прототипу є те, що під час використання цього засобу можуть виникнути спазми, тому що жостер дає посилену дію на перистальтику кишечника, а водний настій м'яти, валеріана та айр за своїми властивостями не можуть компенсувати негативну дію відвару кори жостеру, що знижує терапевтичний ефект.

Задача винаходу: Запобігти у новому складі проносного засобу посилення дії відвару кори жостеру на перистальтику кишечника.

Встановлена задача вирішена розробкою засобу, що володіє проносним ефектом, який включає відвар кори жостеру, водний настій м'яти.

Відрізняючими ознаками винаходу є те, що:

– водний настій м'яти готують разом з кмином, а склад збору додатково містить спиртовий настій вовчуга, масло касторове та ароматизатор.

Склад містить таке співвідношення компонентів, мл:

– Відвар кори жостеру – 200;

– Водний настій м'яти та кмину – 200, при цьому беруть 50 г м'яти та 20 г кмину на 1 стакан (200 г) кип'ячої води;

– Спиртовий настій вовчуга (готова форма) –

50;

– Масло касторове – 50;

– Ароматизатор – 2–3 краплі.

Додаткове введення плодів кмину у склад запропонованого засобу обумовлено властивостями кмину, зокрема його проносною, жовчогінною, бактерицидною діями. Крім того, кмин сприяє усунуванню процесів бродіння у кишечнику, метеоризму та стимулює травлення.

Спиртовий настій вовчуга (готова форма) усуває запальні процеси кишечнику;

Масло касторове оказує проносну дію та сприяє поліпшенню пасажу вмісту кишечника завдяки ефекту зм'якшення.

Ароматизатор, наприклад масло Фенхеля, сприяє усунуванню метеоризму та поліпшенню засвоєності заявляемого засобу.

За заявленим рішенням проведені дослідження на 40 хворих у відділенні гастроентерології клініки Інституту терапії АМН України. Проведені дослідження дозволили визначити оптимальний кількісний склад компонентів.

Заявляемий засіб здійснюють наступним чином:

1. Готують відвар кори жостеру на водяній бані протягом 15 хвилин із розрахунку: 50 г кори на 250 мл води. Вихід відвару – 200 мл.

2. Готують водний настій м'яти разом з кмином шляхом настоювання протягом 1 години із розрахунку: 50 г м'яти та 20 г кмину на 1 стакан кип'ячої води. Вихід – 200 мл.

3. Змішують відвар кори жостеру та водного настою м'яти та кмину, який готують за п. 2, та додають спиртовий настій вовчуга у кількості 50 мл, масло касторове у кількості 50 мл, ароматизатор, наприклад масло Фенхеля, у кількості 2–3 краплі крапель.

(19) UA (11) 34950 (13) A

4. Рекомендують приймати приготовлений засіб по 30 мл (2 столових ложки) на 1 стакан мінеральної води до зникнення суб'єктивної клінічної симптоматики.

Можливість здійснення запропонованого засобу у медичній практиці підтверджується на прикладі лікування хронічного спастичного коліту.

Приклад. Хворий М., 42 р., поступив у клініку Інституту терапії АМН України з скаргами: почуття дискомфорту у середній частині живота, нудота, зниження апетиту, затримка випорожнення більш 2–3 доби. Об'єктивні дані: при пальпації живота визначається хворобливість в мезогастральній та правій клубовій зонах, проекції сигмоподібної кишки.

Проведені інструментальні дослідження: діагностична ректороманоскопія-катаральний проктосигмоїд, рентгенологічне дослідження товстої кишки-долихосигма. За результатами проведених досліджень встановлені діагнози: хронічний спастичний коліт, катаральний проктосигмоїдит, долихосигма.

За заявленим рішенням хворому М., призначено засіб, що володіє проносним ефектом.

Склад засобу наступний:

– відвар кори жостеру, водний настій м'яти та кмину, спиртовий настій вовчуга, масло касторове та ароматизатор.

Засіб готують за п.п. 1,2,3, опису (с. 2). Через тиждень після початку прийому цього засобу у хворого М. наступила відносна нормалізація випорожнення, були зменшені диспептичні явища, апетит став краще. Хворий М. виписан із стаціонару з клінічним поліпшенням, йому дані рекомендації відносно подальшого прийому заявляемого засобу.

Призначена контрольна ректороманоскопія через 2 тижні.

Висновок: Використання запропонованого засобу у медичній практиці дозволяє підвищити терапевтичний ефект, зменшити запальний процес слизової кишечника та відвернути побічні явища.

Тираж 50 екз.

Відкрите акціонерне товариство «Патент»
Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101
(03122) 3 – 72 – 89 (03122) 2 – 57 – 03
