



УКРАЇНА

(19) UA (11) 4315 (13) U

(51) 7 A61N1/10, A16B17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ  
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидається під  
відповідальність  
власника  
патенту

## (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

1

2

(21) 20040402945

(22) 16.03.2004

(24) 17.01.2005

(46) 17.01.2005, Бюл. № 1, 2005 р.

(72) Шевчук Сергій Вікторович

(73) Український державний науково-дослідний  
інститут реабілітації інвалідів

(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, що включає режим, дієту, глюкокортикостероїди, імунодепресанти, нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти, який відрізняється тим, що хворому додатково призначають лікувальний препарат ериніт по 10 мг 4 рази на добу

Спосіб лікування системного червоного вовчака (СЧВ) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на системний червоний вовчак.

Способи лікування СЧВ відомі. До них відносяться способи комплексної терапії, що базуються на використанні гормональних та негормональних імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних препаратів, антикоагулянтів та антиагрегантів (див. А.И. Окорков. Лечение болезней внутренних органов. М., 1999. - т.2. - С. 137-140).

Недоліком цих способів є недостатня їх ефективність, що проявляється подальшим прогресуванням і розвитком ускладнень.

В основу корисної моделі поставлене завдання розробити такий спосіб лікування, який зупиняє прогресування процесу і дає стійку ремісію.

Таке завдання забезпечується тим, що на фоні базисної терапії системного червоного вовчака хворому дають ериніт по 10 мг 4 рази на добу. Клінічний ефект починає проявлятися вже на 5-6 день, проходять спазми судин, покращуються рухи

в суглобах, знімається оніміння в кінцівках, нормалізуються показники сечі.

Застосування способу. Хворому на системний червоний вовчак поряд з імунодепресантами, нестероїдними протизапальними препаратами щоденно дають ериніт по 10 мг 4 рази на добу. Лікування продовжують 1-2 міс. до отримання стійкого результату, який проявляється розкутістю суглобів, проходженням болю, спазму судин, нормалізацією показників сечі.

Конкретний приклад застосування способу, Хвора Ш., 42 років, поступила в клініку з діагнозом, СЧВ, акт II ст., хронічний перебіг, поліартрит, дифузний пневмосклероз ДН-I, синдром Рейно.

Призначено преднізолон 25 мг на добу, вольтарен, плаквеніл, гепарин, трентал. Загальний стан хворої дещо покращився, однак основні клінічні синдроми залишилися.

На фоні базисної терапії хворій призначено ериніт по 10 мг 4 рази на день. На 6-й день пройшла задишка, скутість суглобів, спазм судин і біль в ногах. В подальшому стан покращувався. Випи-сана додому на 10-й день зі стійким результатом.

---

Комп'ютерна верстка А. Крулевський

Підписне

Тираж 37 прим

---

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП 03680 Україна

---

ДП "Український інститут промислової власності" вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601