



УКРАЇНА

(19) UA (11) 51055 (13) A
(51) B A61N1/10, A61B17/00МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

1

(21) 2001128902
(22) 21 12 2001
(24) 15 11 2002
(46) 15 11 2002, Бюл. №11, 2002 р.
(72) Шевчук Сергій Вікторович
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

2

(57) Спосіб лікування системного червоного вовчака, що включає використання режиму, дієти, імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних засобів, антикоагулянтів, антиагрегантів, який відрізняється тим, що як лікувальний препарат застосовують пробукол по 250 мг 2 рази на добу протягом 3 місяців

Запропонований спосіб лікування системного червоного вовчака (СЧВ) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на СЧВ з наявністю синдрому Рейно.

Способи лікування СЧВ відомі. До них відноситься комплексна терапія, яка базується на використанні режиму, дієти, ГКС, імунодепресантів, амінохінолонових похідних, нестероїдних протизапальних засобів, антикоагулянтів та антиагрегантів (див. А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. М., 1999 - т. 2 - С. 137 - 146). В деяких випадках використовують гемосорбцію. Недоліком перерахованих способів лікування є недостатня ефективність, особливо при синдромі Рейно, який має місце у 95% хворих на СЧВ.

В основу винаходу поставлено завдання розробки такого способу лікування, який би знімав спазми судин або попереджав розвиток синдрому Рейно.

Таке завдання забезпечується тим, що на фоні базисної терапії СЧВ хворим призначають пробукол по 250мг 2 рази на добу протягом трьох місяців. При цьому зникає спазм судин, проходить синдром переміжної хромоти, кульгавість, цианоз шкіри. Раніше для лікування хворих на СЧВ пробукол не застосовувався. Він є (див. А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов - М., 1999 - Т. 3 - С. 27 - 28) гіпохолестери-

немічним засобом, що знижує рівень холестерину в крові.

Застосування способу. Хворому на СЧВ поряд з режимом, дієтою, ГКС, імунодепресантами, НПЗП дають щоденно 2 рази на добу пробукол по 250мг на протязі 3 місяців. Клінічний ефект починає спостерігатись через два тижні від початку прийому препарату, досягаючи максимуму через 2 - 3 місяці. Він проявляється зняттям спазму судин, нормалізацією кольору шкіри, проходженням кульгавості.

Конкретний приклад застосування способу.

Хвора Ж., 27 років, поступила в клініку 25.01.01 з діагнозом СЧВ, акт II, хронічний перебіг, фотосенсибілізація, поліартрит ПФС І ст., міокардитичний міокардіосклероз СН І, синдром Рейно, трофічні виразки гомілок. Протягом трьох тижнів хвора отримувала преднізолон по 30мг на добу, плаквеніл 0,2 - двічі на добу, месулід 100мг - 2 рази на добу, гепарин, плазмафореz N 3. Загальний стан хворої дещо покращився, але явища синдрому Рейно залишились. На фоні базисної терапії хворій було призначено пробукол по 250мг 2 рази на добу. Вже на 17 добу явища спазму судин зникли, пройшла кульгавість. Виразки гомілок почали очищатись, з'явилися ділянки епітелізації. Через 30 днів після призначення пробуколу виразки зникли повністю. Кінцівки стали теплими на дотик.

(19) UA (11) 51055 (13) A

ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)
вул. Сим'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119, Україна
(044) 456 – 20 – 90

ТОВ «Міжнародний науковий комітет»
вул. Артема, 77, м. Київ, 04050, Україна
(044) 216 – 32 – 71