



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 54067

(13) A

(51) 7 A61K35/78

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ГІПОТОНІЧНО-ППОКІНЕТИЧНОЇ ФОРМИ

1

2

(21) 2002043592

(22) 29 04 2002

(24) 17 02 2003

(46) 17 02 2003, Бюл. № 2, 2003 р.

(72) Гарник Тетяна Петрівна

(73) Гарник Тетяна Петрівна

(57) Збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпотонічно-ппокінетичної форми, що містить листя м'яти перцевої, який відрізняється тим, що додатково включає траву

чистотілу великого, квіти ромашки аптечної, траву дерев'яку звичайного, листя подорожника великого при наступному співвідношенні компонентів, мас %

листя м'яти перцевої	5,0 - 10,0
трава чистотілу великого	0,5 - 10,0
квіти ромашки аптечної	15,0 - 20,0
трава дерев'яку звичайного	15,0 - 20,0
листя подорожника великого	15,0 - 20,0

Винахід відноситься до медицини і стосується створення рослинних засобів для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпотонічно-ппокінетичної форми.

Гіпотонічно-ппокінетична форма дискінезії жовчовивідних шляхів характеризується гіпотонічним станом жовчного міхура і сфінктера Одді.

Відомі засоби для лікування гіпотонічно-ппокінетичної дискінезії - препарати аліо, настій женьшеню, жовчогінні засоби рослинного походження (холеретичні, холекінетичні) (Полосухина В.А. Холецистити і дискінезії жовчних шляхів - Алма-Ата, 1987 - С.27, Стахів І.В. Фітотерапія дискінезії жовчовивідних шляхів - Харків, 1979 - С.314 - 315).

Однак всі ці засоби є недостатньо ефективні, оскільки здійснюється навантаження на печінку за рахунок застосування одночасно декількох препаратів різної дії.

В якості прототипу засобу для лікування гіпотонічно-ппокінетичної ДЖШ взятий збір лікарських трав, який включає листя бобівника трьохлистого - 25 0, корінь тирлича жовтого - 25 0, корінь кульбаби звичайної - 10 0, листя м'яти перцевої - 20 0.

Недоліком цього засобу є недостатня ефективність та дефіцит сировини листя бобівника трьохлистого.

В основу даного винаходу поставлено задачу розробити такий збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпотонічно-ппокінетичної форми, який би за своїм складом та співвідношенням компонентів підвищував ефекти-

вність лікування та була доступна сировина.

Поставлена задача вирішується тим, що збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпотонічно-ппокінетичної форми, що містить, листя м'яти перцевої, відповідно винаходу, додатково включає траву чистотілу великого, квіти ромашки аптечної, траву дерев'яку звичайного, листя подорожника великого при наступному співвідношенні компонентів, мас %: листя м'яти перцевої - 5 0 - 10 0, трава чистотілу великого - 0 5 - 1 0, квіти ромашки аптечної - 15 0 - 20 0, трава дерев'яку звичайного - 15 0 - 20 0, листя подорожника великого - 15 0 - 20 0.

Правильним лікуванням дискінезії можна попередити розвиток хронічного гепатиту та холелітазу.

Гіпотонічно-ппокінетична форма ДЖШ характеризується постійним тупим, м'яким болем в правому підребер'ї, що обумовлено застоєм у жовчному міхурі. Частіше зустрічається у жінок астеничної конституції. Дія збору лікарських трав, що пропонує автор, в даному випадку, направлена на ліквідацію застою жовчі, підвищення тону жовчного міхура та психомоторну стимуляцію. Поєднання дії та вибране співвідношення м'яти перцевої, трави чистотілу великого, квітів ромашки аптечної, трави дерев'яку звичайного, листя подорожника великого забезпечує як бактерицидну та протизапальну дію так і підсилює жовчоутворення, жовчовиділення, знімає спазми як із жовчних протоків так і з сфінктера Одді, жовчного міхура, підвищує тонус та забезпечує повільне відновлення імунної

(13) A

(11) 54067

(19) UA

системи

Компоненти зборів дозволені для використання офіційною медициною та є доступними

Збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпотонічно-гіпокінетичної форми готують до застосування таким чином

Подрібнена суміш - 10,0 заливається 200мл крутого кип'ятку та настоюється 3 - 4 годний. Приймають по 70мл настою в теплому вигляді 3 рази на день за 30хв до їжі. Курс лікування становить 3 - 4 тижні

Приклад. Хвора К. 46 років. На основі суб'єктивних даних та клініко-лабораторного обстеження поставлений діагноз ДЖШ гіпотонічно-гіпокінетична форма. Скарги на постійну тупу біль

в правому підребер'ї, відсутність апетиту, тошноту, пркоту в роті, незначну біль в зоні жовчного міхура. Призначено лікування настоем збору лікарських трав за винаходом. Через 6 діб хвора відчула покращення самопочуття, з'явився апетит, зменшились прояви болю. Через 4 тижні лікування пацієнтка почуває себе задовільно. Рекомендовано при необхідності повторити курс лікування.

Таким чином, збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпотонічно-гіпокінетичної форми покращує ефективність лікування - нормалізує функціональний стан як жовчного міхура так і сфінктера Одді, дозволяє уникнути виникнення хронічного гепатиту та холелітіазу та є доступним за сировиною.