



УКРАЇНА

(19) UA (11) 55670 (13) A

(51) 7 A61N1/10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДВидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

1

2

(21) 2002043042

(22) 15 04 2002

(24) 15 04 2003

(46) 15 04 2003, Бюл. № 4, 2003 р.

(72) Шевчук Сергій Вікторович

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

(57) Спосіб лікування ревматоїдного артриту, що включає щоденну терапію аравою (лефлуномідом) і детралексом, який відрізняється тим, що детралекс призначають за 7 днів до початку терапії аравою

Запропонований спосіб лікування ревматоїдного артриту (РА) відноситься до медицини, зокрема до ревматології. Він призначений і може бути використаний при лікуванні хворих на ревматоїдний артрит (РА).

Відомо багато способів лікування РА. Їх застосування залежить від форми захворювання, ступеню активності запального процесу, стадії захворювання тощо. Відомий спосіб лікування РА нестероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ) і ГКС (див. А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. М., 1999, т. 2, с. 48 - 80). Недоліком цього способу є недостатня ефективність і виникнення досить серйозних побічних ефектів.

В останні роки розроблено новий препарат бізисної терапії араву (лефлуномід), який є ефективним імуносупресором (див. Karyn Seemasko et al. Inhibition of IAKS and STAT6 Tyrosine Phosphorylation by the Immunosuppressive Drug Lef lunomide leads to a Block in IgG 1 Production. The Journal of Immunology, 1998, 160: 1581 - 1588). Лефлуномід пригнічує інтерлейкіни і фактор некрозу пухлин, попереджує проліферацію Т-клітин. Його застосування при РА виявилось ефективним. Однак цей спосіб лікування ревматоїдного артриту має недо-

ліки. Основними з них є недостатня ефективність, сповільнене настання ефекту - не раніше 4-х тижнів з моменту початку лікування, значна кількість побічних дій і ускладнень, висока вартість лікування.

В основу винаходу поставлена задача розробки такого способу, який підвищує ефективність, попереджує виникнення побічних ефектів і зменшує вартість лікування.

Така задача забезпечується тим, що при РА за 7 днів до початку прийому лефлуноміду призначають детралекс по 500мг двічі на добу щоденно, а з восьмого дня додатково дають лефлуномід по 10мг щоденно.

Як показали наші клінічні дослідження, застосування такої схеми і комбінації препаратів приносить досить ранній лікувальний ефект, значно кращі і стабільні результати, виключає виникнення побічних ефектів, помітно здешевлює лікування.

Застосування способу. Після встановлення діагнозу, хворому призначають детралекс по 500мг двічі на добу. На восьму добу, продовжуючи лікування детралексом, призначають лефлуномід по 10мг щоденно.

(13) A

(11) 55670

(19) UA

