



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 56155

(13) C2

(51) 7 A61B17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВОДЯНКИ ОБОЛОНОК ЯЄЧКА ПО М.А.МОРОЗУ

1

2

(21) 98084495

(22) 19 08 1998

(24) 15 05 2003

(46) 15 05 2003, Бюл. № 5, 2003 р.

(72) Мороз Михайло Антонович

(73) Мороз Михайло Антонович

(56) RU C1 2040243 25 07 95

RU C1 2115368 20 07 98

(57) Спосіб хірургічного лікування водянки оболонок яєчка, який полягає в тому, що після розтинання шкіри каплитки в рану виводять яєчко з оболонками та пунктують, який відрізняється тим,

що після пункції з випусканням рідини, оболонки яєчка розтинають на протилежній стороні розташування додатка яєчка аж до парієтального листка піхової оболонки яєчка із наступним вивільненням яєчка від оболонок, відшаровують парієтальний листок на всьому протязі від внутрішньої сім'яної фасції до країв придатка яєчка та висікають відшаровану ділянку, після чого яєчко знову занурюють в оболонки і ушивають рану

Спосіб відноситься до медицини, для істотного удосконалення хірургічного лікування водяний оболонок яєчка

Відомі способи хірургічного лікування водянки оболонок яєчка (по Вінкельману, Бергману) мають недоліки які сприяють підвищенню травмування яєчок після операцій. Це настає в зв'язку з тим, що оболонки водянки яєчка вивертають навкруги додатка яєчка (метод по Вінкельману) або висікають оболонки яєчка (метод по Бергману). Після проведення операції, яєчко залишається в нефізіологічних умовах, розташоване безпосередньо під шкірою.

При проведенні операції по Вінкельману, розтинають всі оболонки яєчка до вісцерального листка властивої оболонки яєчка. Рідину випускають. Всі оболонки вивертають навкруги додатка яєчка. Краї рани оболонок яєчка зшивають між собою. Яєчко знаходиться безпосередньо під шкірою каплитки (мошонки), що сприяє травмуванню яєчка.

Метод Бергмана більш травматичний, бо при ньому висікають всі оболонки яєчка. Яєчко тратить свій кремастерний рефлекс піднімання при холоді доверху.

При методі Вінкельмана комок оболонок яєчка встановлений навкруги додатка складає картину для хворого, що у нього після операції утворилось друге яєчко.

Суть запропонованого методу хірургічного лі-

кування водянки яєчка заключається в тому, що з метою запищення всіх оболонок яєчка навкруги яєчка, запищення яєчка в його фізіологічному футлярі відшаровують та висікають тільки зовнішній (парієтальний), листок властивої оболонки яєчка.

Спосіб запропонованої операції. Проводять місцеве знеболювання (новокаином 0,5%). Розтинають шкіру каплитки по передньозовнішній поверхні каплитки. В рану виводять яєчко зі всіма його оболонками. Оболонки яєчка розтинають на протилежній стороні розташування додатка яєчка, до вісцерального його листка, внутрішньої властивої оболонки яєчка. Випускають рідину, оболонок яєчка. Оболонки яєчка вивертають, як при операції по Вінкельману. Відшаровують парієтальний листок властивої оболонки яєчка до ділянки додатка яєчка. При затрудненні відшарування оболонки пов'язаного з рубцевими змінами, проводять гідралічну препаративку оболонки. Після відшарування парієтального листка властивої оболонки яєчка всі оболонки ввертають, в порожнину оболонок встановлюють яєчко. Краї рани оболонок яєчка зашивають рідкими кетгуттовими швами. Яєчко з оболонками встановлюють в порожнину каплитки. Дренування порожнини каплитки гумовою полоскою. Асептична пов'язка. При описаній операції яєчко займає положення всередині оболонок які захищають його від травми, зберігають кремастерний рефлекс.

(13) C2

(11) 56155

(19) UA

