



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 56464

(13) A

(51) 7 A61B17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ

1

2

(21) 2002054463

(22) 31 05 2002

(24) 15 05 2003

(46) 15 05 2003, Бюл. № 5, 2003 р.

(72) Подольський Василь Васильович, Дронова
Вікторія Леонідівна(73) ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І
ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УК-
РАЇНИ

(57) Спосіб лікування хронічних запальних захворювань шийки матки у жінок фертильного віку шляхом використання базисної терапії, який відрізняється тим, що після усунення мікробного фактора хворим жінкам для зняття запальних змін та загоєння ерозованої поверхні шийки матки призначаються антигомотоксичні препарати траумель-С, внутрішньом'язово, та траумель-С, мазь, за індивідуальною схемою лікування

Винахід відноситься до медицини, зокрема до гінекології. Відомий спосіб лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань статевих органів у жінок з використанням розчину солей Мертвого моря з додаванням есенції масел лаванди, ромашки, евкаліпту, розмарину, тим'яну та планг-плангу, які мають антисептичну, протизапальну, знеболюючу дію, патент №37812А.

Згаданий вище спосіб не дає можливості впливати на регулюючі системи організму, зокрема у жінок з хронічними запальними захворюваннями геніталій.

Найбільш близьким за технічною суттю є спосіб застосування препаратів клотримазолу, мазі Канестена та піхвових свічок бетадін в поєднанні з метранідозолом, ністатиним, циклофероном, неовіром та криохірургічним методом для лікування фонових захворювань шийки матки (Н.В. Лубенкова, Л.П. Галоян, Н.Г. Артемьев «Особенности лечения у женщин псевдоэрозии шейки матки в сочетании с трихомониазом хирургическим методом», Сборник научных трудов «Актуальные вопросы репродуктологии и криомедицины», Харьков, 1998г., С 145-150).

Зокрема цей метод використано для лікування шийки матки, після проведення криодеструктивної операції.

Крім того, враховуючи значну поширеність захворювань даної групи, великий арсенал медикаментозних та інших лікарських препаратів дотепер майже не використовувався принцип «лікувати не хворобу, а хворого».

В основу винаходу поставлена задача ство-

рення способу лікування хронічних запальних захворювань шийки матки у жінок фертильного віку з використанням антигомотоксичної терапії, яка дасть можливість сприяти покращенню клітинного метаболізму в ділянці шийки матки, а також дозволить не тільки знизити матеріальні витрати пацієнтів, але й термін лікування в середньому на один тиждень.

Поставлена задача способу лікування хронічних запальних захворювань шийки матки у жінок фертильного віку згідно винаходу додатково вирішується шляхом використання антигомотоксичних препаратів траумель-С (внутрішньо-м'язово в/м) та траумель-С (мазь), за індивідуально обґрунтованою схемою лікування.

Необхідність удосконалення способів лікування хронічних запальних захворювань шийки матки у жінок фертильного віку обумовлена високою частотою різноманітних ускладнень, зокрема ерозіями шийки матки, різноманітними дисплазіями шийки матки, непліддям, які є серйозною загрозою для репродуктивної функції жінки і для здоров'я взагалі. Недивлячись на те, що на сьогодні існує значний спектр медикаментозних і немедикаментозних заходів (хімічний, термічний та холододовий вплив на тканини шийки матки), які використовуються для лікування цих захворювань, всі вони діють лише на одну, окремо взятую ланку патогенезу.

Наші дослідження дозволили розробити спосіб лікування хронічних запальних захворювань шийки матки, який шляхом відновлення гомеостазу регулюючих систем і опосередковано через них стимулює метаболічні процеси в ураженому органі.

(13) A
(11) 56464
(19) UA

Спосіб лікування включає два етапи. Перший етап - включає в себе вплив на інфекційний агент, виявлений за допомогою мікробіологічного та вірусологічного дослідження, препаратами відповідної чутливості. Після цього проводиться контрольне мікробіологічне та вірусологічне дослідження. В разі знешкодження інфекційного агенту приступають до другого етапу лікування.

Необхідність призначення другого етапу лікування зумовлена запальними змінами на шийці матки, які часто поєднуються з початковими стадіями дисплазії та ерозії. Для цього застосовується антигомотоксичний препарат траумель-С, який має протизапальну, знеболюючу дію, покращує клітинне дихання, окислювально-відновні процеси та активізує загоєння раневої поверхні (зокрема ерозованої шийки матки). Препарат вводиться по одній ампулі внутрішньо-м'язево, один раз на добу протягом п'яти діб. Поряд з цим на уражені ділянки шийки матки накладаються мазеві аплікації кремом траумель-С, два рази на добу протягом одного тижня.

Спосіб лікування хронічних запальних захворювань шийки матки у жінок фертильного віку пояснюється наступними прикладами.

Приклад 1 - Хвора Н., 30 років мешканка м. Львова. Клінічний діагноз: хронічний цервіцит, ерозія шийки матки.

Поступила в клініку зі скаргами на болі в ділянці статевих органів, кров'янисті виділення під час статевого акту. Хворіє на протязі 6 місяців. Звертались за медичною допомогою за місцем проживання де їй запропонували «прижигання» шийки матки. Але після звертання за медичною допомогою ІПАГ АМН України було проведено мікробіоло-

гічне та вірусологічне обстеження, яке виявило у високому титрі патогенний стафілокок, стрептокок та гриби роду Кандида. Проведений перший етап лікування дозволив позбавитись інфекції, але ерозована поверхня шийки матки залишилась.

Проведений другий етап лікування з використанням препаратів траумель-С під контролем кольпоскопічного дослідження, показав повне зникнення патологічного процесу і ділянці шийки матки.

Приклад 2

Хвора Г., 20 років мешкає в м. Києві. Клінічний діагноз: хронічний вагініт, хронічний цервіцит, дисплазія шийки матки 1-го ступеня. Хворіє протягом 3-х місяців. Лікувалась за місцем проживання, але через один місяць захворювання поновилось.

В клініці після мікроскопічного та вірусологічного обстеження були виявлені у високому титрі гарднерели, коринебактерії та вірус статевого герпесу. Після проведеного 1-го етапу лікування контрольні мікробіологічні обстеження показали, що переліковані вище збудники інактивовані, але на шийці матки залишалися запальні зміни тканин і був призначений другий етап лікування препаратами траумель-С протягом одного тижня. При контрольному кольпоскопічному обстеженні патологічних змін на шийці матки не виявлено.

Використаний в даному способі лікування антигомотоксичних препаратів сприяє покращенню клітинного метаболізму в ділянці шийки матки, активізує загоєння ерозованої поверхні шийки матки, надає протизапальну та знеболюючу дію, що позитивно впливає не тільки на стан репродуктивного здоров'я, але й нормалізує сексуальний та психоемоційний стан жінки.