



УКРАЇНА

(19) UA (11) 59065 (13) A

(51) 7 A61K35/78

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДВИДАЄТЬСЯ ПІД
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ВЛАСНИКА
ПАТЕНТУ(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ШКІРНИХ ЕКЗЕМАТОЗНИХ ПРОЯВІВ У ЖІНОК ПЕРИМЕНО-
ПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

1

2

(21) 2003010005

(22) 02 01 2003

(24) 15 08 2003

(46) 15 08 2003, Бюл. № 8, 2003 р.

(72) Дудченко Микола Олексійович, Васильєва
Катерина Володимирівна, Стасюк Ганна Мико-
лаївна(73) Дудченко Микола Олексійович, Васильєва
Катерина Володимирівна, Стасюк Ганна Мико-
лаївна(57) Спосіб комплексного лікування шкірних екзе-
матозних проявів, що включає використання
біогенного препарату рослинного походження на
фоні традиційного лікування, який відрізняється
тим, що як біогенний препарат призначають перо-
рально гомеопатичний препарат "Ременс" по 20
крапель 3 рази на день за 30 хвилин до прийому
їжі протягом не менш ніж 2 тижнів

Запропонований спосіб відноситься до галузі
медицини, а саме до шкірних та венеричних хво-
роб.

Відомий спосіб лікування екзем (д мед н
Э Н Солошенко "Екзема современные представ-
ления об этиопатогенезе и методах рациональной
терапии" Международный медицинский журнал
№3 1997 г., с 24-29)

Найбільш близьким до запропонованого спо-
собу є спосіб комплексного лікування шкірних ек-
зематозних проявів, що включає місцеве викорис-
тання біогенного препарату рослинного
походження "Ирикар" у вигляді крему та мазі на
фоні прийому загально прийнятих (традиційних)
лікарських засобів, по 3-4 рази на добу протягом 4-
х тижнів (В Г Коляденко, Р Ниднер, Й Тоокстра,
А А Куба нова, С Нидрие "Препараты Cardio-
spermum halicababum серьезная альтернатива в
нестероидной терапии экземы" "Ліки України" №5
1999 р, с 49-51) Однак відомий спосіб має недо-
статній ступінь ефективності обумовлений тим, що
використання біогенного рослинного препарату
місцево не забезпечує одержання тривалого пози-
тивного лікувального ефекту, крім того відомий
спосіб лікування не враховує статі хворого, віку,
супутньої патології (нерегулярність менструально-
го циклу у жінок перименопаузального періоду,
емоційна лабільність, припливи, пітливість, пору-
шення сну)

В основу винаходу поставлено завдання ство-
рити спосіб комплексного лікування шкірних екзе-
матозних проявів шляхом удосконалення відомо-

го, досягти підвищення ступеню ефективності
лікування за рахунок індивідуального підходу до
кожного випадку захворювання з урахуванням ста-
ті, віку, супутньої патології та забезпечити одер-
жання тривалого лікувального ефекту

Поставлену задачу вирішують створення спо-
собу комплексного лікування шкірних екзематоз-
них проявів у жінок перименопаузального періоду,
що включає використання біогенного гомеопатич-
ного препарату рослинного походження на фоні
традиційного лікування, який згідно винаходу
відрізняється тим, що в якості біогенного гомеоп-
атичного препарату призначають пероральне вико-
ристання гомеопатичного препарату "Ременс" по
20 крапель 3р на день за 30 хвилин до прийому
їжі протягом не менш 2-х тижнів

Біогенний рослинний препарат "Ременс" ви-
робляється фірмою Ріхард Бттнер ГмбХ, у склад
препарату входять цимицифуга діурська,
сангвінарія канадська, кірказон ломоносовидний,
чорна каракатиця, отрута змії куруку

Застосування "Ременсу" при клімаксі ліквідує
припливи, пітливість, серцебиття, запаморочення,
мігрені, позбавляє від емоційної нерівноваженос-
ті, роздратованості, покращує настрій, стабілізує
артеріальний тиск, нормалізує жировий обмін, чи-
нить протизапальну дію, підвищує адаптаційні мо-
жливості організму жінки

Спосіб лікування шкірних екзематозних про-
явів у жінок перименопаузального періоду здійс-
нюється наступним чином, на фоні традиційного
лікування (антигістамінні препарати, протизапальні

(13) A

(11) 59065

(19) UA

препарати, імунокорегуючі препарати, антибіотики та ін, місцеве лікування примочки, мазі з кортикостероїдними гормонами та ін) додатково призначають біогенний гомеопатичний препарат "Ременс" по 20 крапель 3 рази на день за 30хв до прийому їжі в чистому вигляді або розведений с столовій ложці води

В залежності від важкості проявів клімаксу (кількість припливів на добу, роздратованість, відчуття оніміння кінцівок, тремор, коливання артеріального тиску, пітливість) курс лікування препаратом "Ременс" може тривати до 6 місяців, але не менш ніж 2 тижнів

Хвора М, 48 років, домогосподарка, поступила в стаціонар ПОШВД в травні 2002 року зі скаргами на появу висипу в ділянці передпліч, живота, сильний свербіж. Діагноз при надходженні "Мікробна екзема". Перші ознаки захворювання виникли 3 місяці тому, хвора пов'язує з порушенням менструального циклу. Водночас з нерегулярністю менструального циклу хвора відмічає появу "приливів", відчуття жару, підвищення потовиділення, порушення сну, роздратованість. Самостійно не лікувалась. Об'єктивно на шкірі передпліч, живота вогнища пперемії, інфільтрації, множинні вузликові висипки, мокнуття, гнійні кірочки. Лабораторні данні загальний аналіз крові та сечі без патології. Лікування настоянка валеріани по 25кр. Двічі на день, лоратадин 1 пігулка в день, глюканат кальцію 10%-10мл в/в, Бісептол 480 по 2т двічі на день протягом 4-х днів та гомеопатичний препарат "Ременс" по 20 крапель тричі на день за 30хв до приймання їжі. Місцеве танінова примочка, цинкова паста, поксізон.

Покращення загального стану відбувалось на 3-4 день лікування. Клінічні ознаки екземи повністю регресували на 7-8 день. Хвора виписана з повним регресом шкірних проявів, значним по-

кращенням загального стану. Продовжувала прийом "Ременсу" на протязі 6 місяців. Скарги на "приливи", роздратованість та інше не відмічає. Рецидивів екземи не було.

Хвора Т, 49 років, продавець, поступила до стаціонару зі скаргами на висипи в ділянці доло-ней, передпліч, свербіж. Діагноз при надходженні

"Хронічна екзема в стадії загострення". Вважає себе хворою на протязі 10 років, коли вперше з'явилась висипка, мокнуття, свербіж на долонях, передпліччях. Лікувалась стаціонарно. Близько 8 років рецидивів не було. Загострення стану пов'язує з нерегулярністю менструального циклу на протязі останніх 6 місяців. Відмічає підвищену роздратованість, знижену працездатність, приступи тахкардії, "приливи". Об'єктивно на шкірі передпліч і долоней інфільтрація, пперемія, підсилення шкірного малюнку, вузликові висипи, "серозні кринички". Загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі без патології. Лікування: настійка валеріани по 25кр. Двічі на день, лоратадин 1 пігулка в день, глюканат кальцію 10%-10мл в/в та гомеопатичний препарат "Ременс" по 20 крапель тричі на день за 30хв до приймання їжі. Місцеве борна примочка, мазь "Флуцинар".

Загальний стан покращався на 5-й день лікування. Хвора виписана на 10 день лікування з повним регресом клінічних ознак екземи. Приймала "Ременс" протягом 6 місяців, рецидивів екземи не було, прояви патологічного клімаксу перестали турбувати.

Запропонованим способом проліковано 21 жінку перименопаузального віку. Що дозволило значно скоротити перебування у стаціонарі та на лікарняному листі, підвищити ефективність лікування і якість життя жінок перименопаузального періоду.