



УКРАЇНА

(19) UA (11) 59608 (13) A

(51) 7 A61B17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІОПИС  
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ  
НА ВІНАХІДвидається під  
відповідальність  
власника  
патенту

## (54) СПОСІБ ВИВЕДЕННЯ ЧЕРВОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА

1

2

(21) 2002108040

(22) 09 10 2002

(24) 15 09 2003

(46) 15 09 2003, Бюл. № 9, 2003 р.

(72) Михайлович Віктор Васильович

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

(57) Спосіб виведення червоподібного відростка, який полягає в тому, що червоподібний відросток виводять з черевної порожнини з місця відчленування його від куполу сліпої кишки, який відрізняється тим, що перед виведенням червоподібного відростка, у місці відчленування від сліпої кишки його фіксують затискачем у черевній порожнині.

Винахід стосується медицини, зокрема хірургії, і може бути використаний для виконання операції апендектомії.

Відомий такий спосіб виведення червоподібного відростка [1]. Під час апендектомії в операційну рану підтягують купол сліпої кишки, який фіксують рукою. За допомогою анатомічного пінцета виводять червоподібний відросток, який утримують за край брижі затискачем. Якщо відросток довгий, фіксований зростами, має коротку немобільну брижу, виникають певні труднощі з його виведенням. У таких випадках під основу відростка проводять тонку гумову або пластикову трубку для фіксації, а купол сліпої кишки занурюють в черевну порожнину, що полегшує виведення відростка в операційну рану.

Необхідність виведення в операційну рану куполу сліпої кишки, яка, займаючи певну частину операційного доступу (нерідко досить значну), зменшує можливість маніпуляцій для виведення червоподібного відростка, при надмірній тракції травмується і десерозується.

В основу винаходу поставлене завдання полегшити виведення червоподібного відростка з черевної порожнини і фіксувати його в операційній рані під час апендектомії.

Поставлене завдання досягається тим, що у спосіб виведення червоподібного відростка, який полягає в тому, що червоподібний відросток виводять з черевної порожнини з місця відходження

його від куполу сліпої кишки, згідно з винаходом, перед виведенням червоподібного відростка, у місці відходження від сліпої кишки його фіксують затискачем в черевній порожнині.

Завдяки фіксуванню червоподібного відростка в черевній порожнині без виведення куполу сліпої кишки, збільшується огляд операційного поля, що дає додаткові можливості маніпулювання з червоподібним відростком, покращує огляд органів черевної порожнини через операційну рану.

На фіг. 1 показана фіксація червоподібного відростка за його основу, на фіг. 2 - виведення червоподібного відростка в рану.


Спосіб здійснюють таким чином.

Після операційного доступу ідентифікують купол сліпої кишки і місце відходження червоподібного відростка. На початковий відділ червоподібного відростка, який, як правило, змінений найменше, накладають інструмент (фіг. 1) і, після затиснення його, здійснюють тракцію за брижу і відросток. Інструмент переміщують у верхній кут рани. При необхідності відросток тимчасово фіксують другим інструментом (фіг. 2) і маніпуляцію повторюють до повного виведення відростка в рану.


Джерела інформації

1. Шевчук М. Г., Генюк С. Н., Хохоль В. П., Панченко С. Н. Неотложные оперативные вмешательства в абдоминальной хирургии. Киев, "Здоров'я", 1988. С. 35.

(13) A  
(11) 59608  
(19) UA



Фиг.1



Фиг.2