



УКРАЇНА

(19) UA (11) 76509 (13) C2
(51) МПК (2006)
A61K 35/54 (2006.01)
A61P 25/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ

1

(21) 2004042416
(22) 01.04.2004
(24) 15.08.2006
(46) 01.08.2006, Бюл. №8, 2006р.
(72) Садеков Ібрагім Абдуллович
(73) Садеков Ібрагім Абдуллович
(56) Н.Н. Заваденко и др. Церебролизин в лечении синдрома дефицита внимания с гиперреактивностью у детей - Неврологический журнал, 1999, №2, т.4 с. 37-42
Н.Н. Заваденко, Т.Ю. Успенская, Н.Ю. Суворинова
Диагностика и лечение синдрома дефицита внимания у детей - Журнал неврологии и психиатрии, 1997, №1, т.97, с. 57-61

2

И.П. Брызгунов, О.В. Гончарова, Е.В. Касатикова
Синдром дефицита внимания с гиперреактивностью у детей: протокол лечения - Российский педиатрический журнал, 2001, №5, с.34-36
UA A 51024 15.11.2002
RU C2 2163802 20.06.1999
US B2 6586427 01.07.2003
UA A 36466 16.04.2001
(57) Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей, який виконують введенням внутрішньом'язово кріоконсервованої суспензії фетальної церебральної тканини по 1,8мл чотири рази інтервалом у три доби.

Винахід відноситься до психіатрії та неврології, а саме для лікуванні синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей. Відомі способи лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності з використанням психостимуляторів (6), пірацетаму (1), тіорідазіну (3) інстенону (5), церебролізіну (3) амітриптіліну (1). Але їх використання супроводжуються побічними діями: порушення сну, зниження апетиту, ваги тіла, затримки росту, збільшення частоти пульса та тиску, а також відносним, нестійким ефектом (2, 5). Психостимулятори протипоказані дітям молодше 6 років, маючим тікозний розлад, підвищення тиску ліквора (2, 5). Ефективність лікування з використанням традиційних засобів складає 22-71%. Внаслідок цього пошук нових способів лікування залишається актуальним. Задачею винаходу являється підвищення ефективності терапії синдрому дефіциту уваги та гіперактивності при відсутності побічних дій та протипоказань.

Заявлений спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності включає: комплексне клініко-психологічне дослідження, призначення лікування, курсу корегуючої терапії з контрольним клініко-психологічним дослідженням, який відрізняється тим, що для лікування в якості коректора призначається кріоконсервована суспензія фетальної церебральної тканини (кріоцелл-

кріоцеребрум виробництва НДІ кріобіології та кріомедицини АМН України) по оригінальній схемі: 1,8мл внутрішньом'язово №4 з інтервалом в три доби.

Заявлений спосіб апробовано при лікуванні поряд 30 хворих синдромом дефіциту уваги та гіперактивності з ефективністю 74% (31% в контрольній групі) при відсутності побічних дій та значно більшої тривалості ефекту. Позитивний ефект виражався в покращенні характеристик поведінки (по даним оцінки структурованого опитування для батьків), показників моторики (в вигляді зменшення прояв статико-локомоторної недостатності), а також когнітивних функцій, уваги, що зафіксовано в медичних картах хворих. При ЕЕГ - картировані виявлені достовірні відмінності початкових параметрів ЕЕГ в дослідній групі хворих з різноманітній ефективністю терапії.

Джерела інформації:

1. Бадалян Л.О., Заваденко Н.Н., Успенская Т.Ю. Синдром дефицита внимания у детей. Обзор психиатрии и мед. психол. им. В.М. Бехтерева, 1993, №3, с.74-90.

2. Брызгунов И.П., Гончарова О.В., Касатикова Е.В. Синдром дефицита внимания с гиперреактивностью у детей: протокол лечения. Росс. пед. журнал, 2001, №5, с.34-36.

(19) UA (11) 76509 (13) C2

3. Заваденко Н.Н., Горбачевская Н.Л., Грир-
выева Н.В., Сорокин А.Б., Суворинова Н.Ю., Яку-
пова Л.П. Церебролизин в лечении синдрома де-
фицита внимания с гиперактивностью у детей.
Неврологический журнал. 1999. №2, С. 37-42.

4. Заваденко Н.Н., Успенская Т.Ю., Суворина
Н.Ю. Диагностика и лечение синдрома дефицита
внимания у детей. Журнал неврологии и психиат-
рии им. С.С.Корсакова, 1997, т. 97, №1, С. 57-61.

5. Заваденко Н.Н., Петрухин А.С., Семенов
П.А. и др. Лечение гиперактивности с дефицитом
внимания у детей: оценка эффективности различ-
ных методов фармакотерапии. Московский мед.
журнал, 1998, С. 19-23.

6. Wilens T.E., Biederman J. The stimulants.
Psychiatr. Clin. North Amer., 1992. Vol. 15, P. 191-
222.