



УКРАЇНА

(19) UA (11) 12033 (13) U
(51) МПК (2006)
A61K 9/08

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

1

2

(21) u200507350

(22) 25.07.2005

(24) 16.01.2006

(46) 16.01.2006, Бюл. № 1, 2006 р.

(72) Ганинець Павло Павлович, Гела Адам Аксентійович, Паздерський Юрій Антонович, Чебаненко Олександр Іванович, Шестопапов В'ячеслав Михайлович

(73) Гела Адам Аксентійович

(57) Спосіб приготування гомеопатичних препаратів, що включає проведення ступінчастого розведення гомеопатичного початкового матеріалу (ма-

теринської тинктури) розчинником, при цьому гомеопатичний розчин сильно та ритмічно струшують зверху вниз не менше 10 разів протягом декількох хвилин, який відрізняється тим, що як розчинник використовують генетично ідентичний з гомеопатичним початковим матеріалом (материнською тинктурою) розчинник, яким є дисперсійне середовище, що відокремлено у дисперсійній системі гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) від її гомогенату (дисперсної фази).

Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до приготування гомеопатичних препаратів і медикаментів, які використовуються для терапевтичного лікування.

Відомий спосіб приготування гомеопатичних препаратів шляхом розведення діючої речовини з молочним цукром або розведень у спиртово-водному розчині, або у дистильованій воді і подальших розведень [Т. Д. Попова і Т. Я. Зеликман Гомеопатическая терапия. Киев "Здоровья" 1990г. стр.20].

Недоліком такого способу виготовлення гомеопатичних препаратів є те, що він не дозволяє отримати гомеопатичні препарати без зайвих домішок.

Найбільш близьким за технічною суттю до корисної моделі, що заявляється, є відомий спосіб приготування гомеопатичних препаратів потенціюванням. Цей спосіб виготовлення гомеопатичних препаратів передбачає ступінчасте розведення гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) рослинного або тваринного походження, яким може бути витиснутий із рослин сік, рідкий екстракт із свіжих або висушених рослин, секрет рослин та розчинника, в якості якого використовують воду, етиловий спирт чи гліцерин, причому потенціювання проводять з різним ступенем розведення, а саме: низький ступінь, середній ступінь, та високий ступінь. [Сб. "Научные взгляды, лекарственные средства и терапевтические мето-

ды". Под редакцией Франца Шмида. По материалам работы Лекарственной комиссии по вопросам Биологической Медицины, Общества Хуфеланда по холистической медицине. 1990. Издательство Aurelia-Verlag GmbH Publishers, Баден-Баден, Германия, стр. 98-99.]

За відомим способом, кожне конкретне ступеневе розведення гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) здійснюється розчинником, наприклад водою. І якою б вона не була за походженням: артезіанською, джерельною, потірковою або криничною все одно вона є відмінною за критеріями питомої ваги, макро-мікроеlementного складу, летких речовин, автотонної мікрофлори, рН, тобто за щільністю і в'язкістю відрізняється від дисперсійного середовища гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури). Разом з тим, важливе значення для фізико-хімічних властивостей води має вплив технічних умов шляхів подачі води (труби, нагнітальні апарати, фільтри, резервуари, хлорування та ін.) з родовищ різних географічних зон та місць споживання.

Розбавлення такою водою (навіть якщо вона була б дистильованою вона є неідентичною за своїми властивостями щодо гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) призводить до різних фізико-хімічних конфліктів, певною мірою спотворює хімічну структуру гомеопатичного препарату, що виготовляється.

(19) UA (11) 12033 (13) U

Таким чином, відомим способом не досягається ідеального кінцевого результату - чистоти гомеопатичного препарату, тобто того стану гомеопатичного препарату, який не містить домішок, або чого-небудь побічного, зайвого.

В основу корисної моделі поставлена задача опрацювання способу приготування гомеопатичних препаратів шляхом використання генетичне ідентичного розчинника, властивості якого відповідають властивостям дисперсійного середовища гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) і на цій основі, в кінцевому результаті, забезпечити одержання ідеально чистих гомеопатичних препаратів, а також можливість розширення застосування видів гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) іншого генезу крім рослинного і тваринного походження.

Поставлена задача вирішується тим, що в способі приготування гомеопатичних препаратів, за яким проводять ступінчасте розведення гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) розчинником, при цьому гомеопатичний розчин сильно та ритмічно струшують зверху вниз не менше 10 разів протягом декількох хвилин, згідно з корисною моделлю, в якості розчинника використовують генетичне ідентичний з гомеопатичним початковим матеріалом (материнською тинктурою) розчинник, яким є дисперсійне середовище, що відокремлено у дисперсійній системі гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) від її гомогенату (дисперсної фази).

Використання розчинника, в якості якого є дисперсійне середовище, що виділено із дисперсійної системи гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) є відповідним дисперсійному середовищу гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури), є натуральним, без зайвих домішок, автентичним (своїм же) ідеальним розчинником для ступеневого розбавлення і потенціювання (динамізації) в процесі виготовлення гомеопатичних препаратів і має значущі переваги над цільною водою як розчинником.

Для виготовлення такого розчинника застосовується новий в гомеопатії готовий гомеопатичний початковий матеріал (материнська тінктура), що створений "природною технологією"- підземна мінеральна вода. Вона не є штучним продуктом, а просочується крізь поруваті породи (фунти) екстрагує з них відповідні елементи та забезпечується легкими речовинами і аутохтонною мікрофлорою.

Виготовлення гомеопатичних розчинів різних

ступенів розведення можна здійснити в умовах бальнеологічного курорту і подавати централізовано у бювети пацієнтам, використовуючи при цьому технічні засоби. Окрім цього, виготовлення гомеопатичних препаратів можна налагодити на промисловому рівні в різному асортименті ступенів розведення для аптечної мережі.

Застосування підземних мінеральних вод різних типів мінералізації у вигляді відповідних потенційованих препаратів в лікувальній практиці базуватиметься на загальних клінічних підходах, які використовуються пацієнтами при внутрішньому прийомі підземних мінеральних вод малої мінералізації в залежності від стадій захворювання, особливостей його перебігу і продовжності гострого періоду захворювання.

Приклад конкретного виконання способу одержання гомеопатичних препаратів.

В якості гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) використовують підземну мінеральну воду. Для того, щоби із вказаного гомеопатичного початкового матеріалу (материнської тинктури) одержати необхідні розведення гомеопатичного препарату, діють наступним чином.

1. Одержання перших ступінчастих десятикових розведень гомеопатичного препарату-розчину від 50 до 500мл мінеральної води наведені у Таблиці 1.

Якщо потрібно одержати 50мл гомеопатичного препарату-розчину десятикового розведення, беруть 5мл підземної мінеральної води, помішують її у чисту посудину і доливають туди 45мл власної очищеної води, яка одержана як дисперсійне середовище із дисперсійної системи підземної мінеральної води відокремленням її гомогенату (дисперсної фази). Потім закривають посудину і інтенсивно струшують зверху вниз не менше 10 разів протягом декількох хвилин.

Для одержання наступних за кількістю мілілітрів десятикових розведень гомеопатичного препарату додають починаючи з 2 пункту Таблиці 1 по 5мл мінеральної води і по 45мл власної очищеної води, які в сумі відповідають належній кількості мілілітрів гомеопатичного препарату-розчину. Після струшування достатньої кількості разів, ліки, які утворилися в середині закритої посудини відповідають першому десятиковому розведенню гомеопатичного препарату і позначаються цифрою 1 з хрестиком після неї - 1х, або латинською буквою "D" перед цифрою 1.

Таблиця 1

№ п/п	Підземна мінеральна вода, мл	Власна очищена вода, мл	Гомеопатичний розчин, мл	Символи ступеня розведення
1	5	45	50	1х або D1
2	10	90	100	1х або D1
3	15	135	150	1х або D1
4	20	180	200	1х або D1
5	25	225	250	1х або D1
6	30	270	300	1х або D1
7	35	315	350	1х або D1

Продовження таблиці 1

8	40	360	400	1х або D1
9	45	405	450	1х або D1
10	50	450	500	1х або D1

Мінералізація гомеопатичних препаратів різних ступенів розведення залежатиме від мінералізації типів мінеральних вод в кожному окремому випадку.

2. Для того, щоби одержати подальші десяткові розведення від 50 до 500мл, які наведені у Таблиці 2, беруть 5мл тільки що отриманого гомеопатичного розчину 1х, переносять в іншу чисту

посудину і доливають туди 45мл розчинника - власної очищеної води, тинктура якої відповідна материнській тинктурі. Потім закривають посудину та інтенсивно струшують протягом декількох хвилин і отримують друге десяткове розведення (2х або D2). Так повторюють до тих пір, поки не буде одержаний гомеопатичний препарат необхідного ступеня розведення.

Таблиця 2

№ п/п	Гомеопатичний розчин першого десяткового розведення,мл	Власна очищена вода,мл	Друге десяткове розведення гомеопатичного розчину,мл	Символи ступеня розведення
1	5	45	50	2х або D2
2	10	90	100	2х або D2
3	15	135	150	2х або D2
4	20	180	200	2х або D2
5	25	225	250	2х або D2
6	30	270	300	2х або D2
7	35	315	350	2х або D2
8	40	360	400	2х або D2
9	45	405	450	2х або D2
10	50	450	500	2х або D2

3. З метою одержання гомеопатичного препарату сотих розведень, які наведені у таблиці 3, проводять те саме, що і для одержання гомеопатичного препарату десяткових розведень, проте до 1мл мінеральної води доливають 99мл розчин-

ника - власної очищеної води. В результаті отримують перше соте розведення підземної мінеральної води, яке визначається в рецепті цифрою без хрестика або 1 СН.

Таблиця 3

№ п/п	Підземна мінеральна вода,мл	Власна очищена вода,мл	Гомеопатичний розчин,мл	Символи ступеня розведення
1	1	99	100	1СН
2	2	198	200	1СН
3	3	297	300	1СН
4	4	396	400	1СН
5	5	495	500	1СН

Для одержання гомеопатичного препарату другого сотого розведення беруть 1мл гомеопатичного препарату-розчину із посуду з розведенням 1СН, помішують в чисту посудину і доливають туди 99мл розчинника - власної очищеної води.

Для одержання гомеопатичного препарату 10

сотого розведення з підземної мінеральної води потрібно зробити 10 послідовних кроків, переносячи за кожним разом в нову посудину по 1мл гомеопатичного розчину попереднього розведення та добавляючи необхідну кількість розчинника, при цьому струшувати кожне нове розведення.