



УКРАЇНА

(19) UA (11) 37629 (13) A

(51) 7 A61B17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ  
НА ВИНАХІДвидається під  
відповідальність  
власника  
патенту

## (54) СПОСІБ УСУНЕННЯ ДЕФОРМАЦІЇ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ ПІСЛЯ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ

(21) 2000031765

(22) 08.06.2000

(24) 15.05.2001

(33) UA

(46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р.

(72) Довбиш Ніна Олександрівна

(73) Національний медичний університет ім  
О.О.Богомольця (НМУ)(57) Спосіб усунення деформації верхньої губи  
після хейлопластики за допомогою клаптів з боко-

вих відділів верхньої губи та ротованих назустріч один одному, який відрізняється тим, що відновлення вкорочених бокових фрагментів верхньої губи здійснюють за допомогою клаптів, викроєних з бокових відділів серединного фрагмента і ротованих латерально в горизонтальне положення з кожної сторони з наступним підшиванням їх до бокових фрагментів губи, після цього червону облямівку пришивають в правильному положенні до сформованої частини верхньої губи.

Винахід відноситься до медицини, а саме, - до хірургії щелепно-лицевої ділянки.

Відомий спосіб хейлопластики при двосторонньому незрощенні верхньої губи, при якому вертикальне вкорочення губи в ділянці серединного фрагмента усувають за допомогою повношарових клаптів, викроєних з бокових відділів верхньої губи та ротованих - медіально з кожної сторони назустріч один одному разом з червоною облямівкою (Гонко Е.В. Способ операции при врожденных двусторонних неполных расщелинах верхней губы. - а.с. № 619177 Бюл. № 30, 15.08.1978). Проте при добре розвиненому серединному фрагменті і вкорочених за висотою бокових фрагментах застосування способу стає неможливим.

Задача винаходу - усунення тяжкої деформації верхньої губи, а саме, - відновлення висоти верхньої губи в ділянці бокових фрагментів і відновлення конфігурації червоної облямівки.

Задача досягається шляхом реоперації хейлопластики, під час якої після відсепаровки червоної облямівки верхньої губи на всю товщу висікають вертикальні рубці з кожної сторони (при цьому знов утворюється двостороннє незрощення верхньої губи, що стало поводом для вибору способу-прототипа, і дозволяє запропонований спосіб усунення деформації верхньої губи також віднести до способів хейлопластики. Відновлення вертикально вкорочених бокових фрагментів верхньої губи здійснюють за допомогою повношарових клаптів, викроєних з бокових відділів добре розвиненого серединного фрагмента і ротованих латерально в горизонтальне положення з кожної сторони з наступним підшиванням їх до бокових фрагментів губи. Після цього червону облямівку пришивають в правильному положенні до сформованої частини

верхньої губи.

На фіг. 1 - вид спереду: 1 - добре розвинений серединний фрагмент верхньої губи, 2 - вкорочений боковий фрагмент верхньої губи (як зліва, так і справа), 3 - деформована червона облямівка, 4 - незмикання губ в результаті вертикального вкорочення бокових фрагментів верхньої губи.

На фіг.2 - вид спереду: 3 - відсепарована червона облямівка, відведена гачком донизу, 5 - з бокових відділів серединного фрагменту верхньої губи викроєні повношарові клапті з основою вниз (стрілками вказаний напрямок, ротації клаптів в ділянці дефектів верхньої губи у бокових відділах, 6 - лінія змикання губ (підкреслює величину дефекту тканин верхньої губи в бокових відділах).

На фіг. 3 - вид спереду: 2 - взаємовідношення елементів після операції у бокових відділах відновлена за рахунок клаптів з серединного фрагменту 5, підшитих до вертикально вкорочених бокових фрагментів 2 з кожної сторони, 3 - червона облямівка підшита в правильному положенні до сформованої верхньої губи.

Спосіб виконують наступним чином: під місцевою чи комбінованою анестезією наскрізним розтином відсепаровують червону облямівку і відводять гачком. Також наскрізним розтином на всю товщу висікають вертикальні рубці між серединним та боковими фрагментами губи. При цьому знов утворюється двостороннє незрощення верхньої губи. Далі приступають до основного моменту реоперації хейлопластики. З метою збільшення висоти бокових фрагментів губи викриюють повношарові клапті з добре розвиненого серединного фрагменту з його бокових відділів з основою вниз, клапті ротують латерально в горизонтальне положення з кожної сторони (фіг.2 - 5), а потім під-


(19) UA (11) 37629 (13) A

шивають до бокових фрагментів губи, чим забезпечують відновлення їх висоти (фіг.3 - 2, 5). Відсепаровану червону облямівку (фіг.2 - 3) підшивають в правильному положенні (фіг.3 - 3) до сформованої губи. Поліамідні шви знімають на 12-14 добу.


Клінічний приклад. Хворий С.А. (IX .№ 763), 22 роки, поступив до клініки НМУ з приводу виразної вторинної деформації і дефекту верхньої губи після хейлопластики, яку проведено раніше при дво-

сторонньому незрошені верхньої губи. 3.10.1991 р. проведена операція - пластика губи (реоперація хейлопластики) за запропонованим способом. Післяопераційний період без ускладнень. Косметичний результат добрий.


Запропонований спосіб дозволяє раціонально відновити верхню губу й конфігурацію червоної облямівки.



Фіг. 1



Фіг. 2



Фіг. 3

---

ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)  
 Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26  
 (044) 295-81-42, 295-61-97

---

Підписано до друку \_\_\_\_\_ 2001 р. Формат 60x84 1/8.  
 Обсяг \_\_\_\_\_ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам. \_\_\_\_\_

---

УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180.  
 (044) 268-25-22

---