



УКРАЇНА

(19) UA (11) 37882 (13) A

(51) 6 A61P25/32, A61M21/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ АЛКОГОЛІЗМОМ

(21) 2000042432

(22) 27.04.2000

(24) 15.05.2001

(33) UA

(46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р.

(72) Ішук Анатолій Іванович, Бугар Василь Васи-
льович, Нестеренко Микола Миколайович, Ішук Ві-
кторія Анатоліївна, Марчук Наталія Михайлівна(73) Ішук Анатолій Іванович, Бугар Василь Васи-
льович, Нестеренко Микола Миколайович, Ішук Ві-
кторія Анатоліївна, Марчук Наталія Михайлівна(57) Спосіб лікування хворих алкоголізмом шляхом
створення від'ємного умовного рефлексу на алко-
голят, подразнення блукаючого, трійчатого нервів,
який **відрізняється** тим, що хворому проводять
очищення організму 0,1% розчином марганцевоки-
слоного калію, після їжі дають випити медіхронал

28,5 г, через 2-3 години після створення від'ємного умовного рефлексу та проведення тестів на багатопланову поведінку хворого при звичайних стресових ситуаціях, а також підвищення дії інстинктів здоровим способом життя подразнюють трійчатий і блукаючий нерви шляхом рефлекторної голко-скальпаурікотерапії на протязі 20-30 хвилин, потім зрошують поверхню зева і порожнини рота водяним настоем лікарських трав: алое деревовидне, береза біла, деревій тисячолістий, дрік красильний, звіробій звичайний, крушина ламка, кульбаба звичайна, любисток лікарський, м'ята холодна, цистозира бородата, яловець звичайний, полин гіркий в рівному співвідношенні в пропорції 1:10, кількістю 0,3-0,5 мл на протязі 2-3 секунд з наступним 7-8 денним вживанням медіхроналу та водяного настою трав.

Винахід відноситься до медицини, зокрема, до наркології, неврології та психіатрії.

Відомий спосіб лікування хворих хронічним алкоголізмом шляхом формування від'ємного умовного рефлексу на алкоголь, подразнення блудного, трійчатого нервів із наступним зрошенням поверхні зева та порожнини рота (О.Р.Довженко, авторське посвідчення № 1165392).

Відомий спосіб не достатньо радикальний. Недоліком даного методу є додаткова інтоксикація організму хворого при зрошенні поверхні зева і порожнини рота хлоретилом та відсутність стійкого терапевтичного ефекту. Пацієнти також звертають увагу на зниження інстинктів, зокрема, статевого. Суттєвим недоліком методу є те, що не проводиться тестування на багатопланову поведінку хворого при звичайних стресових ситуаціях. Якщо людина із однієї і тієї ситуації бачить один і той же вихід, то вона живе якби в одновимірному просторі, в неї не сформовані стандартні моделі поведінки на стандартну ситуацію без вживання алкоголю, наркотику чи тютюну. Цьому треба вчити до сеансу, без привиття різних моделей поведінки на одну ситуацію дія може привести до непрогнозованих результатів.

Задачею запропонованого винаходу є підвищення ефективності лікування хворих алкоголізмом за рахунок зняття інтоксикації, проведення тестів на багатопланову поведінку хворого при

звичайних стресових ситуаціях та підвищення дії інстинктів.

Поставлена задача досягається за рахунок того, що хворому проводять очищення організму 0,1% розчину марганцевокислого калію, після їжі дають випити медіхронал 28,5 г, через 2-3 години після створення від'ємного умовного рефлексу подразнюють трійчатий і блукаючий нерви шляхом скальпаурікотерапії на протязі 20-30 хвилин, потім зрошують поверхню зева і порожнини рота водяним настоем лікарських трав: алое деревовидне, береза біла, деревій тисячолістий, дрік красильний, звіробій звичайний, крушина ламка, кульбаба звичайна, любисток лікарський, м'ята холодна, цистозира бородата, яловець звичайний, полин гіркий в рівному співвідношенні в пропорції 1:10, кількістю 0,3-0,5 мл на протязі 2-3 секунд з наступним 7-8 денним вживанням цих препаратів, проведенням тестів на багатопланову поведінку хворого при звичайних ситуаціях - стресах та підвищення дії інстинктів здоровим способом життя. Запропонований спосіб виконують наступним чином: хворому дають пити 1-2 л 0,1% розчину марганцевокислого калію. В разі несприйняття марганцевокислий калій вводять парентерально. Погодинно приймається 2-3 г сорбентів: активоване вугілля, карбонлонг, сунамол. В індивідуальних випадках шлунок чистять з допомогою зонда, а кишечник клізмою. Після очищення хворому дають обволікаючі хар-

(19) UA (11) 37882 (13) A

чові продукти: молоко, картоплю, олію, кисіль. Далі, попередньо розчинивши вміст обох частин упаковки медіхроналу в 0,5-0,75 стакані теплої води, пацієнт випиває. Разова доза складає 28,5 г, одноразово. Проводять роз'яснення про поведінку хворого при різних стресових ситуаціях: неприємності на роботі, дома, зустрічі з друзями, які люблять випити. Психотерапевтичними прийомами укріплюються інстинкти організму. Створюють від'ємний умовний рефлекс на вживання алкоголю. Після чого вводять рефлексотерапевтичну голку в лобну ділянку голови з двох сторін глибиною 5-7 см підшкірно на межі з волоссяним покривом. Одноразово вводяться рефлексотерапевтичні голки в точки алкоголізму вушних раковин. Тривалість процедури 20-30 хвилин. По закінченні терміну дії зрошують поверхню зева 1 порожнини рота водяним настоєм лікарських трав: алое деревовидне, береза біла, деревій тисячолітий, дрік красильний, звіробій звичайний, крушина ламка, кульбаба звичайна, любисток лікарський, м'ята холодна, цистозира бородата, яловець звичайний, полин гіркий в рівному співвідношенні в пропорції 1:10, кількістю 0,3-0,5 мл на протязі 2-3 секунд. При необхідності вторинної профілактики назначають медіхронал кожний день по одній упаковці (28,5 г) на протязі 7 днів у вигляді трьох курсів з триденним переривом між ними.

Приклад 1. У хворого Б., 1962 року народження, виражений алкоголізм: головні болі, галюцинації, тремтіння рук, спрага, оклики, гіпертензія, акропарестезії, жовте забарвлення очних яблук. Випив 1 л 0,1% розчину марганцевокислого калію, прийняв 3 г активованого вугілля. Після їжі випив 28,5 г медіхроналу. Проведена психотерапевтична суєстия. Скальпаурікотерапію переніс задовільно. Поверхня зева і порожнини рота зрошена водяний настоєм трав. Хворий одужав.

Приклад 2. Хворий К., 1947 року народження. У хворого гостре отруєння алкогольними напоями.

Важка стадія алкоголізму. В клініці виражені симптоми головної болі, головокружіння, блювота, спрага, бажання похмелитися, пригнічений настрій. При об'єктивному дослідженні: загальмований, погано орієнтується в часі і просторі, слухові галюцинації, піпорексія, нетримання сечі.

Після очищення шлунку 0,1% розчином марганцевокислого калію і прийнятого карболонгу 4 г, через годину після їжі, хворий вжив 28,5 г медіхроналу. На протязі наступної години проводилося роз'яснення про поведінку пацієнта при різних стресових ситуаціях. Після чого зроблена скальп-рефлексотерапія на границі волоссяної частини лобової ділянки з двох сторін глибиною 10 см з одноразовою аурікотерапією в точках алкоголізму двохсторонньо терміном 30 хвилин. Сеанс стрессопсихотерапії закінчився установкою в корі головного мозку протиакогальної домінанті з наступним блокуванням - зрошенням поверхні зева і порожнини рота водяний настоєм 12 трав. Три дні щоденно хворий приймав по 28,5 г медіхроналу, для укріплення статевих інстинктів - йохимбекс по таблетці 4 рази на день. По закінченні проведено фіксуєчий сеанс стрессопсихотерапії строком на три роки. Хворий одужав. Став інструктором здорового способу життя в сім'ї, родині і у себе на виробництві. Про це свідчать відгуки близьких та співробітників. Катмнез 10 років.

Запропонований спосіб лікування хворих алкоголізмом застосований у 30 пацієнтів. Терапевтичний ефект оцінювався по цілому ряду клінічних ознак. Зворотна дія абстинентного синдрому у хворих алкоголізмом, які лікувалися за запропонованим способом, наведені в таблиці.

В результаті застосування вказаного способу у хворих алкоголізмом, як видно з таблиці, виражена зворотна дія абстинентного синдрому настає вже в першу добу, а на другу добу зазначається повне відновлення соматоневрологічного психічного статусу.

Таблиця

Симптоми	Кількість хворих з позитивними ознаками, в добу						
	До лікування	Після лікування					
гіперемія, ін'єкція склер	25	0	0	0	0	0	0
спрага	20	8	0	0	0	0	0
гіпертензія	30	2	0	0	0	0	0
головний біль	30	3	0	0	0	0	0
тремор рук, вік	30	12	0	0	0	0	0
бажання похмелитися	30	4	0	0	0	0	0
порушення сну	30	4	0	0	0	0	0
тахікардія	30	14	0	0	0	0	0
відсутність апетиту	30	0	0	0	0	0	0

ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)
Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26
(044) 295-81-42, 295-61-97

Підписано до друку _____ 2001 р. Формат 60х84 1/8.
Обсяг _____ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам. _____

УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180.
(044) 268-25-22
