

Винахід відноситься до медицини, зокрема до засобів для лікування онкологічних захворювань.

Сьогодні відомі і широко застосовуються в практиці лікування онкологічних захворювань хіміотерапевтичні засоби, променева терапія, хірургічні способи. Хіміотерапія, променева терапія по відомих причинах сприймаються організмом в цілому негативно. Хірургічні способи лікування можуть дати позитивний результат на перших стадіях онкологічного захворювання, і дуже проблематичні на пізніх стадіях захворювання.

Интерес представляють засоби для лікування онкологічних захворювань на основі компонентів рослинного походження, які не дають побічних ефектів. Ефективність компонентів рослинного походження для профілактики і лікування онкологічних захворювань підтверджується численними даними. У комплексі з радикальним онкологічним лікуванням такі засоби підвищують його ефективність, поліпшують якість життя онкологічних хворих, дають можливість провести лікування без важких ускладнень.

Вивчення публікацій, лікувальної практики і рекомендацій народної медицини дозволяє виділити найбільш поширені лікарські рослини, що застосовуються для профілактики і лікування онкологічних захворювань. До них відносяться ромашка лікарська, календула лікарська, сабельник болотний, квітковий пилок, олія соняшникова нерафінована.

Квітковий пилок містить багато білків, амінокислот, мікроелементів, вітамінів. Завдяки унікальному хімічному складу квітковий пилок поставляє організму енергію, підвищує імунну систему і резистентність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, захищає від онкологічних захворювань.

Интернет: (<http://nutrimed.com.ua/content.htm>).

Календула лікарська застосовується для лікування багатьох пухлин, особливо рака молочної залози, матки, яєчників, стравоходу, шлунка, кишечника. Настій квітів календули лікарської, з розрахунку 1 столова ложка на склянку окропу, настояти 15 хвилин, пити по 150мл 3 рази в день до їжі. Або спиртову настойку квітів календули лікарської в співвідношенні 1:5 на горілці пити по 1 чайній ложці 3 рази в день. При раку молочної залози застосовувати зовнішню мазь: 1 чайна ложка соку квітів або 2 чайні ложки спиртової настойки на 50 г розтопленого свинячого несолоного жиру.

Интернет: (<http://vestniknad.narod.ru/Recept/tumor.htm>).

Календулу застосовують як симптоматичний засіб при неоперабельних формах раку. Під дією препарату календули в хворих раком зменшується інтоксикація, зникають диспепсичні явища, поліпшується апетит і сон.

Интернат: (<http://istoki.h1.ru/bib-trav-kalen.shtml>).

Календула затримує розвиток раку. Приготування препарату: 2 чайні ложки сухих квіток залити 2 склянками окропу (денна доза), кип'ятити кілька хвилин, настоювати 1 годину. Пити по 2-3 столових ложки 3 рази в день перед їжею.

Интернет: (<http://fags.yaroslavl.ru/aivarhiv/nml.shtml?nm254.txt>).

Календулу використовують для симптоматичного лікування неоперабельних форм рака стравоходу, шлунка, кишечника, досягаючи при цьому тимчасового поліпшення.

Интернет: (<http://agat.aorta.ru/50/t209-1.html>).

За матеріалами давньоруської писемності серед засобів лікування рака народна медицина згадує ромашку, особливо при раку матки. Застосовують усю траву ромашки у відварі, усередину і зовнішньо.

Интернет: (http://www.alfit.ru/glava3_2.htm).

При раку губи застосовують сушені квітки ромашки. Заварити окропом, дати настоятися і прикладати теплу кашку до пухлини.

Интернет: (<http://www.givitca.ru/index.phtml?a=statya&id=71>).

Настій листів сабельника болотного рекомендується приймати для лікування і профілактики злоякісних пухлин.

Препарати сабельника болотного народна медицина рекомендує приймати у вигляді відвару кореневищ (застосовувати усередину) при раку шлунка і молочної залози.

Примочки з розпареної здрібненої трави сабельника болотного застосовують при різних пухлинах, особливо пухлинах молочної залози (у тому числі при маститі), і для розсмоктування гемороїдальних шишок.

Для лікування раку шлунка застосовують наступний засіб сабельника болотного:

1 столова ложка здрібнених кореневищ сабельника болотного на 1 склянку гарячої кип'яченої води; витримати на водяній бані 15 хвилин; прохолоджувати при кімнатній температурі 45 хвилин; процідити. Залишок віджати і приготовлений відвар довести кип'яченою водою до об'єму 200мл. Приймати усередину по 1 столовій ложці три рази в день.

Интернет: (http://phyto.boom.ru/herbs3/comar_p.htm).

Відоме застосування настойки сабельника болотного для лікування рака крові. Одного столову ложку здрібненого кореневища настоюють у 0,5 літра горілки. Приймати по одній столовій ложці три рази в день за півгодини до їжі. На курс лікування потрібно 3 літри. Інший рецепт: порубати дрібне кореневище сабельника болотного, відміряти порцію - півлітрову банку, залити цю порцію літром горілки, настоювати 3 тижні. Приймати по одній столовій ложці три рази в день.

Интернет: (http://www.alfit.ru/glava3_2.htm).

Ефективність застосування зазначених лікарських трав підвищується, коли вони входять у різні збори, відвари і настойки.

Так, відомий засіб для профілактики і лікування злоякісних пухлин по патенту Російської Федерації №2044547, МКВ⁶ А61Д0 35/78, пріоритет 18.11.1993.

Засіб представляє собою настойку трав, які характеризуються протипухлинною активністю, здатністю знижувати ріст, розвиток пухлинних кліток, посилювати їх руйнування, і трав, що діють на організм загальноозміцнюювально, позитивно впливають на склад крові, стимулювати імунну систему і тонус організму.

До складу засобу входять наступні інгредієнти, у мас. %:

лепеха болотна (корінь)	0,12-0,17
календула (квіти, трава)	0,58-0,62
шипишина (плоди)	0,43-0,47
спориш	0,47-0,43
безсмертник (квіти)	0,62-0,58
калина (ягоди)	0,58-0,62

Мар'їн корінь	0,43-0,47
звіробій (трава)	0,73-0,77
хвощ польовий	0,47-0,43
барвінок рожевий	0,43-0,47
чорниця (лист)	0,47-0,43
смородина чорна (лист)	0,43-0,47
щавель кінський (корінь)	0,62-0,58
шовковиця чорна (плоди)	0,47-0,43
чистотіл (трава)	0,43-0,47
глід (плоди)	0,47-0,43
окопник лікарський (корінь)	0,43-0,47
солодець голий	0,47-0,43
чага, (березовий гриб)	0,77-0,73
лапчатка прямостояча (калган)	0,43-0,47
часник	0,47-0,43
спирт етиловий 40%-ний	- інше

Зазначений засіб дуже складний по своєму складу.

Відомо також засіб для профілактики і післяопераційного лікування злоякісних пухлин по патенту Російської Федерації №2027441, МКВ⁶ А61Д035/78, пріоритет 21.09.1993.

Засіб складається з двох настоек і відвару, до складу яких входять наступні інгредієнти, мас. %:

Настойка I:

корінь дягеля	2,72-4,54
корінь лепехи	1,09-2,18
трава ефедри	1,09-2,18
трава подорожника	1,09-2,18
етиловий спирт	- інше

Настойка II:

корінь переступня	2,54-4,0
корінь сабельника болотного	2,54-4,0
трава ефедри	1,09-2,18
етиловий спирт	- інше

Відвар:

чага (березовий гриб)	2,28-2,66
багульник	0,164-0,246
звіробій	0,164-0,246
безсмертник піщаний	0,0615-0,143
календула	0,164-0,246
корінь оману	0,923-1,13
чорниця (листи)	0,246-0,349
спориш	0,923-1,13
хвощ польовий	0,513-0,718
подорожник	0,164-0,246
цикорій	0,513-0,718
шипишина (плоди)	0,513-0,718
бджолиний мед	19,487-21,538
дистильована вода	- інше

Черговість приймання настоек і відвару, що входять до складу препарату, наступна: настойку I приймають 3-4 рази в добу по 50 капель за 20-30 хвилин до їжі і запивають 75г відвару. Термін приймання настойки I- 45 доби. Потім перерив - 14 днів. Настойку II приймають 3-4 рази в день по 50 капель за 20-30 хвилин до їжі і запивають 75г відвару. Термін приймання - 45 діб.

Зазначені засоби включають багато компонентів, процедура застосування настоек і відвару складна.

З урахуванням особливості засобу для лікування онкологічних захворювань, що заявляється, інтерес, як аналоги, представляють препарати на основі нерафінованої соняшникової олії.

Відоме застосування суміші нерафінованої соняшникової олії зі спиртом для лікування раку і саркоми. Суміш готують таким чином: 30-40мл нерафінованої соняшникової олії наливають у ємність, додають таку ж кількість спирту, розведеного до 40%, або горілки, закривають ємність кришкою і струшують 2-3 хвилини. Отриману суміш швидко випивають до того, як олія відокремитися від спиртового розчину. Приймати препарат необхідно 3 рази в день, за дві години до прийому препарату нічого не їсти. Після прийому препарату рекомендується не їсти і не пити 15-20 хвилин. Рекомендується виконувати лікування за наступною схемою: 10 днів приймати препарат у зазначеному порядку, після чого зробити 5-денну перерву; повторно приймати препарат 10 днів, знову зробити перерву 5 днів; 10 днів приймати, перерва уже - 2 тижні. Потім цей цикл продовжувати. Лікування рекомендується проводити за такою схемою 2-3 роки.

Інтернет: (<http://www.pnz.ni/publish/penzatv/246.htm>).

Застосування суміші нерафінованої соняшникової олії зі спиртом для лікування онкологічних захворювань відомо як методика Н. Шевченка. Стверджується, що лікувальний ефект суміші соняшникової олії з горілкою заснований на тому же принципі, що і променева терапія - на надмірному посиленні реакцій перекисного окислювання, які активно йдуть у ракових клітках. Ці реакції мають ланцюговий характер, перекидаються на жири клітинних мембран і клітки гинуть. При лікуванні сумішшю олії з горілкою зміст кисню в тканинах знижується.

Інтернет: (<http://sled-ok.by.ru/k/method/Shevchenko.htm>).

Загальними ознаками засобу, що заявляється, і аналога являється застосування як основи засобу олії соняшникової нерафінованої.

Зазначений засіб не достатньо ефективний, про що свідчать відгуки в мережі Інтернет за результатами його застосування.

Як прототип вибраний засіб для лікування онкологічних хворих у післяопераційному періоді по патенту Російської Федерації №2201246, МКВ⁷ А61К35/78, пріоритет 28.02.2001.

Засіб містить, у співвідношенні мас.%, олію соняшкову нерафіновану 1,0, корінь лопуха 0,8 і квіти ромашки 0,1.

Готують його таким чином: беруть корінь лопуха, очищують, миють і сушать. Квіти ромашки підсушують не менше 3 доби. Усе подрібнюють, змішують і заливають соняшникову нерафіновану олією. Потім настоюють місяць і проціджують. Отриманий засіб утримують у темному приміщенні при температурі 0-5°C. Зберігається до 5 років.

Застосовується як для внутрішнього застосування (перорально), так і зовнішнього (аплікації на уражені органи, включаючи місце перебування метастазів). Засіб наносять тонким шаром, накривають тонкою поліетиленовою плівкою і зверху чим-небудь утеплюють. У гінекології застосовується у вигляді тампонів в піхву і аплікації на живіт і попереково-сідничну область.

Загальними ознаками засобу, що заявляється, і прототипу являється застосування в ньому як основи олії соняшникової нерафінованої.

Вибраний як прототип засіб застосовується переважно в післяопераційний період. Сама назва винаходу говорить про це (засіб для лікування онкологічних хворих в післяопераційному періоді). Застосування засобу полегшує стан хворого, прискорює видужання, сприяє реабілітації хворого. Однак на інших стадіях онкологічного захворювання його ефективність недостатня.

В основу винаходу поставлена задача удосконалення засобу для лікування онкологічних захворювань, в якому за рахунок підбора компонентів і їх співвідношення забезпечується підвищення ефективності засобу при лікуванні онкологічних захворювань на різних стадіях.

Поставлена задача вирішується тим, що засіб для лікування онкологічних захворювань, що включає як основу олію соняшкову нерафіновану, відповідно до винаходу, додатково містить віск бджолиний, квітковий пилок, олію ромашки лікарської, олію календули лікарської, жовток курячого яйця, олію сабельника болотного при наступному співвідношенні компонентів, у мас.%:

олія соняшникова	
нерафінована	- 40,0-55,0
віск бджолиний	- 10,0-19,0
квітковий пилок	- 1,5-2,0
олія ромашки лікарської	- 11,0-20,0
олія календули	
лікарської	- 11,0-20,0
жовток курячого яйця	- 8,0-12,0
олія сабельника	
болотного	- 3,0-7,0

Перераховані ознаки складають сутність винаходу.

Істотні ознаки винаходу знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з результатом, що досягається, (підвищення ефективності засобу при лікуванні онкологічних захворювань на різних стадіях). Склад, що включає олію соняшкову нерафіновану, віск бджолиний, квітковий пилок, олію ромашки лікарської, олію календули лікарської, жовток курячого яйця, олію сабельника болотного, при зазначеному співвідношенні компонентів, в результаті взаємодії компонентів і явищ синергізму забезпечує засобу унікальні профілактичні і лікувальні властивості, що не властиві його компонентам у роздільності. Застосування зазначеного засобу в багатьох випадках дозволяє вилікувати хворих на різних стадіях хвороби без застосування хіміотерапії, променевої терапії, без хірургічного втручання. Якісний і кількісний склад засобу підібраний експериментально, його ефективність підтверджена практикою застосування, численними прикладами повного видужання хворих.

Нижче приводиться докладний опис засобу, що заявляється, технологія його приготування, а також приклади, що підтверджують його ефективність для лікування онкологічних захворювань.

Основою засобу для лікування онкологічних захворювань є олія соняшкова не-рафінована (40,0-55,0мас.%). Засіб також містить компоненти, що характеризуються протипухлинною активністю, в мас.%:

віск бджолиний	- 10,0-19,0
квітковий пилок	- 1,5-2,0
олія ромашки лікарської	- 11,0-20,0
олія календули	
лікарської	- 11,0-20,0
жовток курячого яйця	- 8,0-12,0
олія сабельника	
болотного	- 3,0-7,0

У таблиці приведені приклади засобу, що заявляється, у межах зазначених співвідношень компонентів.

Таблиця

Найменування компонентів	Композиція 1	Композиція 2	Композиція 3	Композиція 4	Композиція 5
Олія соняшникова нерафінована	40,0	45,0	45,0	40,0	55,0
Віск бджолиний	10,0	10,5	12,0	19,0	10,0
Квітковий пилок	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5
Олія ромашки лікарської	12,0	20,0	14,0	12	11,0

Олія календули лікарської	20,0	12,0	14,0	12	11,0
Жовток курячого яйця	12,0	8,0	9,0	8,0	8,5
Олія сабельника болотного	4,0	3,0	4,0	7,0	3,0

Засіб готують таким чином. В олії соняшниковій нерафінованій розчиняють віск, потім суміш перемішують з квітковим пилком. Після додають олію ромашки лікарської, олію календули лікарської, олію сабельника болотного. Перемішують. Жовток курячого яйця попередньо розминають і додають у суміш. Отриману суміш варять, після чого проціджують і прохолоджують. Готовий засіб має консистенцію мазі.

Отриманий таким чином засіб зберігають у холодильнику при температурі 0- +5°C. Термін збереження в зазначених умовах - один рік.

У залежності від захворювання засіб застосовують усередину (перорально) або зовнішньо (як мазь). Усередину застосовують по 1,5-2,0г три рази в день.

При лікуванні I-II стадії раку курс лікування до двох тижнів.

При лікуванні III стадії раку курс лікування до одного місяця.

Приклади, що підтверджують ефективність засобу, що заявляється, для лікування онкологічних захворювань:

Приклад 1. М. Донецьк, хвора П. Н., 43 років, непрацююча, інвалід другої групи. Діагноз: рак молочної залози 3-й стадії, проведена хіміотерапія, перебувала на обліку в онкологічному центрі. Лікування засобом, що заявляється, по описаній вище процедурі проведено в 2000 році. Після лікування пухлина зникла. Група інвалідності знята.

Приклад 2. М. Донецьк, хворий Г. М., 64 роки. Діагноз: рак сечового пузиря. Пройшов курс лікування протягом 24 днів по описаній процедурі. Пухлина зникла, що підтверджено УЗД.

Приклад 3. М. Москва, хвора Б. А., 48 років. Діагноз: рак матки. Після операції пухлина відновилася. Пройшла курс лікування протягом 32 днів по описаній процедурі. Самопочуття задовільне. У лютому 2003 року знята з обліку.

Приклад 4. Донецька область, Мар'їнський район, хвора С. Л., 36 років. Діагноз: рак правої легені. Пройшла курс лікування по описаній процедурі. Знята з обліку. Самопочуття задовільне.

Приклад 5. М. Донецьк, хвора А., 48 років. Діагноз: рак молочної залози з метастазами на кістці. Хіміотерапія в Донецьком онкологічному центрі. Хірургічне втручання в медичному інституті в м. Кельні. Пройшла курс лікування протягом 45 днів по описаній процедурі. Метастази зникли, що підтверджується онкологічним центром і медичним інститутом, м. Кельн.

Є безліч інших прикладів, що підтверджують ефективність даного засобу.