



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **88418** (13) **U**
(51) МПК (2014.01)
A61B 17/00

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки:	u 2013 12985	(72) Винахідник(и):	Гривенко Ірина Сергіївна (UA)
(22) Дата подання заявки:	08.11.2013	(73) Власник(и):	Гривенко Ірина Сергіївна,
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель:	11.03.2014		вул. Лексіна, 48, кв. 20, м. Сімферополь, АР Крим, 95051 (UA)
(46) Публікація відомостей про видачу патенту:	11.03.2014, Бюл.№ 5		

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТУ

(57) Реферат:

Спосіб лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту включає призначення препаратів базисної терапії, а саме антибактеріальної, гіпосенсибілізуючої, загальноукріплюючої, седативної, імунокорегуючої терапії, та місцевого лікування. Додатково призначають курс ентеросорбенту "Бента", що містить у своєму складі діосмектит, по 3 г тричі на день за 30 хвилин до прийому їжі протягом 7-10 днів.

UA 88418 U

Корисна модель належить до області медицини, зокрема до стоматології, і може бути використана у комплексному лікуванні хворих з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом.

За найближчий аналог вибрано спосіб лікування хронічного афтозного стоматиту [Булкина Н.В., Токмакова Е.В., Мелешина О.В., Ломакина Д.О. Современные аспекты патогенеза и комплексной терапии хронического афтозного стоматита // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 4. - с. 30-33.], що включає призначення препаратів базисної терапії, а саме антибактеріальної, гіпосенсибілізуючої, загальноукріплюючої, седативної, імунорегуючої терапії, та місцевого лікування.

Недоліком відомого способу є недостатня лікувальна ефективність, пов'язана з тим, що дана терапія не впливає на всі ланки патогенезу захворювання, а саме на аутоімунні механізми виникнення хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту.

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити відомий спосіб, в якому за рахунок додаткового використання методів еферентної терапії, а саме ентеросорбції, запропонований метод набуває ефективнішої лікувальної дії.

Поставлена задача вирішується тим, що у способі, що включає призначення препаратів базисної терапії, а саме антибактеріальної, гіпосенсибілізуючої, загальноукріплюючої, седативної, імунорегуючої терапії, та місцевого лікування, додатково призначають курс ентеросорбенту "Бента", що містить у своєму складі діосмектит, по 3 гр тричі на день за 30 хвилин до прийому їжі протягом 7-10 днів.

Ознаками, які співпадають з суттєвими ознаками корисної моделі, що заявляється, є призначення препаратів базисної терапії, а саме антибактеріальної, гіпосенсибілізуючої, загальноукріплюючої, седативної, імунорегуючої терапії, та місцевого лікування.

Технічним результатом корисної моделі є підвищення ефективності лікування хворих з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом, за рахунок сорбційних, мукопротекторних та цитопротекторних властивостей ентеросорбенту "Бента", що містить у своєму складі діосмектит.

Між сукупністю істотних ознак запропонованого способу і очікуваним технічним результатом простежується наступний причинно-наслідковий зв'язок: використання ентеросорбенту "Бента", що містить діосмектит, сприяє покращенню загального стану хворих, скорочує терміни епітелізації афт, сприяє досягненню тривалих ремісій та позитивній динаміці показників гомеостазу, що підвищує лікувальну ефективність комплексного лікування хворих з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом.

Спосіб лікування хронічного афтозного стоматиту полягає у наступному.

При призначенні комплексної базисної терапії, а саме антибактеріальної, гіпосенсибілізуючої, загальноукріплюючої, седативної, імунорегуючої терапії, та місцевого лікування, хворим додатково призначають ентеросорбент "Бента" у дозі 3 гр тричі на день за 30 хвилин до прийому їжі. Для цього вміст пакету з "Бента" розчиняють у 100 мл теплої питної води, ретельно перемішують та приймають всередину. Курс прийому становить 7-10 днів.

Відомості, що підтверджують застосування способу.

Запропонований спосіб ілюструється наступним клінічним прикладом. Хворий Г., 14 років, амбулаторно звернувся у стоматологічний кабінет Сімферопольського ТМО 16.10.2012 р. в плановому порядку з діагнозом: хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Хворому призначено комплексне лікування, що включало в себе призначення препаратів базисної терапії, а саме антибактеріальної, гіпосенсибілізуючої, загальноукріплюючої, седативної, імунорегуючої терапії та місцевого лікування з позитивним ефектом. Епітелізація афт закінчилась на 14 добу від початку лікування. Проте, через 2 місяці (13.12.2012 р.) хворий звернувся з рецидивом захворювання. В зв'язку з чим, повторно проведений курс базисної терапії, який доповнений курсом ентеросорбції препаратом "Бента", що містить у своєму складі діосмектит, за запропонованим способом. Хворим відмічено значне покращення загального стану, починаючи з 2 доби від початку лікування, терміни епітелізації афт скоротились до 8 днів. Оглянутий через 10 місяців. Скарг не виказує, ознак рецидиву хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту не виявлено.

Запропонований спосіб забезпечує вищу, ніж у найближчого аналога, лікувальну, а саме детоксикаційну дію, і може бути рекомендований для застосування у широкій стоматологічній практиці.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

- 5 Спосіб лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, що включає призначення препаратів базисної терапії, а саме антибактеріальної, гіпосенсибілізуючої, загальноукріплюючої, седативної, імунорегуючої терапії, та місцевого лікування, який **відрізняється** тим, що додатково призначають курс ентеросорбенту "Бента", що містить у своєму складі діосмектит, по 3 г тричі на день за 30 хвилин до прийому їжі протягом 7-10 днів.
- 10

Комп'ютерна верстка І. Мироненко

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601