



УКРАЇНА

(19) UA (11) 66092 (13) C2

(51) МПК

A61K 45/06 (2008.01)

A61P 25/32 (2008.01)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(54) ГОМЕОПАТИЧНИЙ ПІДБІР ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА СПОСІБ ЛІКУВАННЯ

1

(21) 2003076967

(22) 24.07.2003

(24) 12.05.2008

(46) 12.05.2008, Бюл.№ 9, 2008 р.

(72) БЕЛАШОВ ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ, UA

(73) БЕЛАШОВ ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ, UA

(56) RU 2 151 610 C1, 27.06.2000

RU 2 133 123 C1, 20.07.1999

RU 2 165 774 C1, 27.04.2001

Адольф Фон Герхард. Практическое руководство к гомеопатической медицине. Издание второе А.Фобрихера. М. Из-во "Двойная звезда", Товарищество "Клышников, Комаров и Ко" 1993

(57) 1. Гомеопатичний підбір для лікування алкогольної залежності, до складу якого входять протилежні гомеопатичні комплекси, що містять зокрема Nux vomica та Opium, який відрізняється тим, що складається з чотирьох гомеопатичних комплексів А, В, С, D, які мають наступний склад:
комплекс А:

Acidum sulfuricum CH 30, 50, 200 x3, 6, 12

Acidum phosphoricum CH 30, 50, 200 x3, 6, 12

Selenium metallicum CH 30, 50 x3, 6 і вище

Staphysagria CH 6, 30, 50, 200 x3, 6, 30

Nux vomica CH 6, 30, 50, 200, 1000 x3, 6, 12, 30

Arsenicum album CH 30, 50, 200, 1000, 5000, 8000, 10000 x3, 6, 12, 15, 30 і вище;

комплекс В:

Opium CH 30, 50, 200, 1000 x3, 6, 12

Aurum metallicum CH 50, 200, 1000 x3, 6, 12, 30 і вище

Sulfur CH 6, 30, 50, 200, 1000, 5000, 8000, 10000 x3, 6, 12, 15, 30

Lachesis mutus CH 200, 1000 x6, 12, 15, 30;

комплекс С:

China CH 6, 50, 200, 500 x2, 3, 6, 12, 15, 30 і вище

Carbo vegetabilis CH 30, 50, 200 x3, 6, 12 і вище

Ranunculus bulbosus CH 6, 30, 50, 200 x3, 6;

комплекс D:

Sepia officinalis CH 50, 200 x3, 6, 12, 30

Caicara carbonica CH 30, 50 x3, 6, 12

Rhus toxicodendron CH 6, 30, 50, 200, 1000 x3, 6, 12

Belladonna CH 6, 30, 50, 200, 1000 x3, 6, 12.

2. Спосіб лікування алкогольної залежності із застосуванням гомеопатичного підбору, до складу якого входять протилежні гомеопатичні комплекси,

2

що передбачає почергове застосування протилежних гомеопатичних комплексів, який відрізняється тим, що застосовують гомеопатичний підбір за п. 1.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що лікування проводять не менш ніж двома послідовними курсами, для яких серед наведених гомеопатичних комплексів вибирають один як базовий препарат для першого курсу і один як препарат вибору.

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що базовий препарат для першого курсу і препарат вибору вибирають в залежності від статі, віку, конституційного типу, схильності до психозів та ступеня алкогольної залежності пацієнта.

5. Спосіб за п. 3 або п. 4, який відрізняється тим, що базовий препарат застосовують протягом 1,5-2 місяців дозою 7-15 гранул щоденно за 20 хвилин до прийняття їжі шляхом розсмоктування під язиком або додаючи до води в кількості до 100 мл, що її має випити пацієнт дрібними ковтками.

6. Спосіб за п. 3 або п. 4, або п. 5, який відрізняється тим, що після проведення першого курсу лікування здійснюють оцінку динаміки лікувального процесу за зміною симптомів захворювання, за результатами якої вибирають новий базовий препарат і препарат вибору для подальших курсів лікування.

7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що базовий препарат і препарат вибору для другого курсу вибирають в залежності від статі, віку, конституційного типу, схильності до психозів та ступеня алкогольної залежності пацієнта.

8. Спосіб за п. 6 або 7, який відрізняється тим, що за відсутності особливих змін після першого курсу лікування як другий базовий препарат вибирають інший гомеопатичний комплекс, а первинно вибраний базовий препарат повністю виключають зі схеми лікування пацієнта.

9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що за відсутності особливих змін після лікування другим базовим препаратом протягом 1,5-2 місяців як третій базовий препарат вибирають гомеопатичний комплекс, який раніше не використовувався, а другий базовий препарат повністю виключають зі схеми лікування пацієнта.

10. Спосіб за п. 6 або 7, який відрізняється тим, що за помірних змін після першого курсу лікування

(13) C2

(11) 66092

(19) UA

як другий базовий препарат використовують гомеопатичний комплекс, первинно обраний як препарат вибору.

11. Спосіб за п. 10, який **відрізняється** тим, що за вираженої позитивної динаміки лікувального процесу здійснюють курс лікування первинно вибраним базовим препаратом.

12. Спосіб за п. 10, який **відрізняється** тим, що за вираженої позитивної динаміки лікування подальше лікування здійснюють, чергуючи первинно вибраний базовий препарат і препарат вибору.

13. Спосіб за п. 10, який **відрізняється** тим, що за мало вираженої динаміки лікувального процесу подальше лікування здійснюють первинно вибраним базовим препаратом, після чого проводять курс лікування препаратом вибору, що не співпадає з первинно вибраним препаратом вибору, який повністю виключається з подальшого лікування.

14. Спосіб за п. 10, який **відрізняється** тим, що за вираженої позитивної динаміки лікувального процесу подальше лікування здійснюють первинно вибраним базовим препаратом з корекцією дози та частоти прийому протягом 6 місяців з консультативним контролем лікаря.

15. Спосіб за п. 14, який **відрізняється** тим, що кратність прийому зменшують до 1 разу на день по 7-10 гранул.

Винахід стосується медицини, переважно нетрадиційної, а саме засобів і способів зняття тягу до алкоголю з використанням гомеопатичних препаратів.

Відомий метод лікування алкогольної залежності із поперединним застосуванням двох протилежних гомеопатичних препаратів: Nux vomica по 12 крупинок 1-2 рази на день протягом місяця, а потім Opium по 7-10 крупинок 1-2 рази на день протягом місяця [Адольф фон Герхардт. Гомеопатія. Практичне керівництво. Друге видання, перероблене і доповнене - М.: Видавництво "Подвійна зірка". Товариство "Клышников, Комарів і К^{ов}", 1993, с. 183].

Застосування відомих препаратів в рамках відомого методу лікування не забезпечує урахування індивідуальних особливостей пацієнтів, зокрема психофізіологічної складової, поведінкових реакцій, життєвого середовища тощо.

Технічна задача винаходу полягає в удосконаленні гомеопатичного підбору для лікування алкогольної залежності, до складу якого входять протилежні гомеопатичні препарати, та способу лікування алкогольної залежності із застосуванням протилежних гомеопатичних препаратів шляхом збільшення кількості складових гомеопатичного підбору до чотирьох гомеопатичних комплексів з розширенням номенклатури речовин, що входять до складу окремих гомеопатичних комплексів і проведенням лікування декількома послідовними курсами, лікувальний препарат для кожного з яких обирають з-поміж чотирьох гомеопатичних комплексів, що входять до складу гомеопатичного підбору, в залежності від статі, віку, конституційного типу, схильності до психозів, ступеня алкогольної залежності пацієнта та динаміки результатів після попереднього курсу лікування, що забезпечує врахування індивідуальних особливостей пацієнтів і таким чином сприяє покращенню результативності лікування.

Комплексний гомеопатичний засіб для лікування алкогольної залежності складається з чотирьох гомеопатичних комплексів: комплексу А [Acidum sulfuricum CH 30,50,200×3,6,12; Acidum phosphoricum CH 30,50,200×3,6,12; Selenium metallicum CH 30,50×3,6 і вище; Staphysagria CH

6,30,50,200×3,6,30; Nux vomica CH 6,30,50,200,1000×3,6,12,30; Arsenicum album CH 30,50,200,1000,5000,8000,10000×3,6,12,15,30 і вище), комплексу В (Opium CH 30,50,200,1000×3,6,12; Aurum metallicum CH 50,200,1000×3,6,12,30 і вище; Sulfur CH 6,30,50,200,1000,5000, 8000,10000×3,6,12,15,30; Lachesis mutus CH 200,1000×6,12,15,30), комплексу С (China CH 6,50,200,500×2,3,6,12,15,30 і вище; Carbo vegetabilis CH 30,50,200×3,6,12 і вище; Ranunculus bulbosus CH 6,30,50,200×3,6) та комплексу D (Sepia officinalis CH 50,200×3,6,12,30; Calcaria carbonica CH 30,50×3,6,12; Rhus toxicodendron CH 6,30,50,200,1000×3,6,12; Bellodonna CH 6,30,50,200,1000×3,6,12].

Спосіб лікування алкогольної залежності передбачає застосування комплексного гомеопатичного засобу, який складається з чотирьох гомеопатичних комплексів: комплексу А [Acidum sulfuricum CH 30,50,200×3,6,12; Acidum phosphoricum CH 30,50,200×3,6,12; Selenium metallicum CH 30,50×3,6 і вище; Staphysagria CH 6,30,50,200×3,6,30; Nux vomica CH 6,30,50,200,1000×3,6,12,30; Arsenicum album CH 30,50,200,1000,5000,8000,10000×3,6,12,15,30 і вище), комплексу В (Opium CH 30,50,200,1000×3,6,12; Aurum metallicum CH 50,200,1000×3,6,12,30 і вище; Sulfur CH 6,30,50,200,1000,5000,8000,10000×3,6,12,15,30; Lachesis mutus CH 200,1000×6,12,15,30), комплексу С (China CH 6,50,200,500×2,3,6,12,15,30 і вище; Carbo vegetabilis CH 30,50,200×3,6,12 і вище; Ranunculus bulbosus CH 6,30,50,200×3,6) та комплексу D [Sepia officinalis CH 50,200×3,6,12,30; Calcaria carbonica CH 30,50×3,6,12; Rhus toxicodendron CH 6,30,50,200,1000×3,6,12; Bellodonna CH 6,30,50,200,1000×3,6,12]. Лікування проводять не менш ніж двома послідовними курсами, для яких серед наведених гомеопатичних комплексів обирають один як базовий препарат для першого курсу і один як препарат вибору в залежності від статі, віку, конституційного типу, схильності до психозів та ступеня алкогольної залежності пацієнта. Базовий препарат застосовують протягом 1,5-

2 місяців дозою 7-15 гранул щоденно за 20 хвилин до прийняття їжі шляхом розсмоктування під язиком або додаючи до води в кількості до 100мл, що її має випити пацієнт дрібними ковтками. Після проведення першого курсу лікування здійснюють оцінку динаміки лікувального процесу за зміною симптомів захворювання, за результатами якої обирають новий базовий препарат і препарат вибору для подальших курсів лікування в залежності від статі, віку, конституційного типу, схильності до психозів та ступеня алкогольної залежності пацієнта. За відсутності особливих змін після першого курсу лікування як другий базовий препарат обирають інший гомеопатичний комплекс, а первинно обраний базовий препарат повністю виключають зі схеми лікування пацієнта, причому за відсутності особливих змін після лікування другим базовим препаратом протягом 1,5-2 місяців як третій базовий препарат обирають гомеопатичний комплекс, який раніше не використовувався, а другий базовий препарат повністю виключають зі схеми лікування пацієнта. За помірних змін після першого курсу лікування як другий базовий препарат використовують гомеопатичний комплекс, первинно обраний як препарат вибору. За вираженої позитивної динаміки лікувального процесу після першого курсу здійснюють курс лікування первинне обраним базовим препаратом і за вираженої позитивної динаміки лікування подальше лікування здійснюють чередуючи первинно обраний базовий препарат і препарат вибору; за мало вираженої динаміки лікувального процесу подальше лікування здійснюють первинно обраним базовим препаратом, після чого проводять курс лікування препаратом вибору, що не співпадає з первинно обраним препаратом вибору, який повністю виключається з подальшого лікування; за вираженої позитивної динаміки лікувального процесу подальше лікування здійснюють первинно обраним базовим препаратом з корекцією дози та частоти прийому (кратність прийому зменшують до 1 разу на день по 7-10 гранул) протягом 6 місяців з консультативним контролем лікаря.

В Таблиці 1 наведений склад гомеопатичних комплексів "Поліпсидин А", "Поліпсидин В", "Поліпсидин С", "Поліпсидин D", які входять до комплексного гомеопатичного засобу для лікування алкогольної залежності.

Перед початком лікування лікар з'ясовує з хворим або його родичами дані про пацієнта (стать, зріст, професія, вік, вага, пропорції статури, особливості характеру, конституціональний тип, тривалість і форма зловживання алкоголем, частота зловживання та середня кількість вживання алкоголю на добу, чи лікувався раніше, стан здоров'я, зміна поведінки в стані сп'яніння, вираженість похмільного синдрому, наявність дратівливості та порушень сну тощо), за результатами чого виставляє стадію алкогольної залежності і конституціональний тип пацієнта по Кречмеру у виді шифру-діагнозу (вік-стать/стадія захворювання/конституціональний тип).

Курс лікування тривалістю до 6-9 місяців здійснюється одним, двома чи трьома препаратами, що підбираються за визначеною схемою, - базово-

го (№1, №2, №3) і препаратом вибору. На підбір базового препарату в деяких випадках (до 40%) іде 2-4 місяця.

Згідно шифр-діагнозу здійснюється підбір препарату по таблицях 2А, 2Б та 3, причому виділений жирно препарат вважається базовим, а інші вважаються препаратами вибору.

Пацієнт приймає перший базовий препарат курсом до 1,5-2 місяців у дозі 7-15 гранул щодня один-два рази на день за 20 хвилин до їжі, розсмоктуючи під язиком чи додаючи у воду, що п'є хворий (до 100 мл) дрібними ковтками. Після проведення курсу лікування оцінюється динаміка лікувального процесу, зміна і нівелювання симптомів хвороби.

Динаміка курсу лікування оцінюється сумарно, додаванням оцінок за п'ятибальною шкалою вираженості вихідних симптомів (всього чотири пункти, кожний з яких оцінюється від 1 до 5-ти балів: психічний стан, похмільний синдром, кількість спиртного та світлі проміжки в днях без спиртного, зміна ставлення пацієнта до своїх алкоголізацій).

За результатами оцінки динаміки здійснюється подальше підбирання препаратів.

I варіант

Якщо сумарний показник (Σ) менше 10 ($\Sigma < 10$), тобто особливих змін у ході лікування нема, то новий базовий препарат (№2) вибирається згідно шифру-діагнозу з таблиці 3. Базовий препарат №1 надалі цілком виключається зі схеми лікування пацієнта.

У таблиці 3 кожному конституціональному типу позиціонують 2 (два) препарати.

У випадку збігу препарату вибору з таблиці 2 з одним із зазначених у таблиці 3 препаратів, цьому препаратіві віддається перевага як базовому препаратіві №2.

У випадку розбіжності препарату вибору з таблиці 2 і препарату з таблиці 3 як базовому препаратіві №2 віддається перевага препаратіві, у назві якого заголовна літера стоїть ближче до початку латинського алфавіту.

(Приклад: Астенічному типу конституції позиціонують препарати П-А і П-С; обираємо П-А.)

За відсутності динаміки в лікуванні (тобто $\Sigma < 10$) базовим препаратом №2 за 1,5-2 місяці (до 13% випадків) призначають наступний курс базовим препаратом №3 з таблиці 3, раніше не використаним. Базовий препарат №2 цілком виключається з подальшого лікування, як і базовий препарат №1.

II варіант

При сумі від 10 до 15 балів ($10 < \Sigma < 15$) наступний курс призначають препаратом вибору з таблиці 2 з наступним чергуванням базового препарату і препарату вибору (курсами 1,5-2 місяці) за вираженої позитивної динаміки лікувального процесу ($\Sigma \geq 16$). Препарат вибору приймається по 7-15 гранул щодня один-два рази на день за 20 хвилин до їжі, препарат елі розсмоктувати під язиком чи додавати до води, що її п'є хворий (до 100 мл) дрібними ковтками.

За маловираженої динаміки процесу ($\Sigma < 10$) після курсу (до 25% випадків) препаратом вибору

повертаються знову до курсу базовим препаратом (1,5-2 місяці, у колишніх дозуваннях), що смінює препарат вибору з таблиці 3, який не збігається з препаратом вибору №1, що цілком виключається з подальшого лікування. При виборі з двох препаратів таблиці 3 перевага віддається препарату, заголовна буква в назві якого ближче до початку латинського алфавіту.

III варіант

Якщо сума складає понад 16 балів ($\Sigma \geq 16$), подальше лікування проводиться базовим препаратом базису з таблиці 2 з корекцією дози і частоти прийому (зменшення кратності прийому до 1 разу на день, зранку, натще, за 20хв. до їжі, по 7-10 гранул під язик, розсмоктувати, або у водянному розчині по 100мл малими ковтками) протягом 6 місяців з консультативним контролем лікаря.

Лікування може проводитися амбулаторне з консультативним спостереженням лікаря 1 разу 1,5-2 місяці.

Гомеопатичний підбір, що є тетрадою гомеопатичного підбору, яка складається з чотирьох комплексних гомеопатичних препаратів, які підбирають за певною методикою індивідуально для кожного пацієнта, дозволяє поєднати уніфікований підхід з урахуванням індивідуальних особливостей. Метод характеризується високим ступенем безпеки застосування препаратів, практичною відсутністю побічних дій, протипоказань, алергійних реакцій. Можливо проводити лікування як за бажанням, так і без бажання пацієнта, оцінюючи результати лікування базуючись на бесідах з його родичами.

Таблиця 1

Склад препаратів "ПОЛІДИПСИН"

№ п/п	Гомеопатична назва, розведення	Назва і вид сировини
1	2	3
ПОЛІДИПСИН - А		
1	Acidum sulfuricum CH 30,50, 200 x 3,6,12	СІРЧАНА КИСЛОТА
2	Acidum phosphoricum CH 30,50,200x 3,6,12	ФОСФОРНА КИСЛОТА
3	Selenium metallicum CH 30,50x 3,6 і вище	МЕТАЛЕВИЙ СЕЛЕН
4	Staphysagria CH 6,30,50,200x 3,6,30	СТЕФАНОВО НАСІННЯ; НАСІННЯ
5	Nux vomica CH 6,30,50,200, 1000 x 3,6,12,30	ЧИЛИБУХА; НАСІННЯ
6	Arsenicum album CH 30, 50, 200, 1000, 5000, 8000,10000x 3,6,12,15,30 і вище	БІЛИЙ МИШ'ЯК
ПОЛІДИПСИН - В		
1	Opium CH 30,50,200,1000x 3,6,12	МАК СНОТВОРНИЙ; МОЛОЧНИЙ СІК
2	Aurum metallicum CH 50,200,1000 x 3,6,12,30 і вище	МЕТАЛЕВЕ ЗОЛОТО
3	Sulfur CH 6,30,50,200,1000,5000,8000,10000 x 3,6,12,15,30	СІРКА
4	Lachesis mutus CH 200,1000x6,12,15,30	СУРУКУКУ (ЛАНЦЕТОПОДІБНА ЗМІЯ); ОТРУТА
ПОЛІДИПСИН - С		
1	China CH 6,50,200,500 x 2,3,6,12,15,30 і вище	ХІННЕ ДЕРЕВО; ВИСУШЕНА КОРА
2	Carbo vegetabilis CH 30,50,200 x 3,6,12 і вище	ВУГІЛЛЯ З БУКА, БЕРЕЗИ
3	Ranunculus bulbosus CH 6,30,50,200 x 3,6	ЖОВТЕЦЬ КЛУБНЕНОСНИЙ; СВІЖА РОСЛИНА (ЧЕРВЕНЬ)
ПОЛІДИПСИН - D		
1	Sepia officinalis CH 50,200 x 3,6,12,30	КАРАКАТИЦЯ; УМІСТ ЧОРНИЛЬНОГО МІШКА
2	Calcaria carbonica CH 30,50 x 3,6,12	ВУГЛЕКИСЛЕ ВАПНО
3	Rhus toxicodendron CH 6,30,50,200,1000 x 3,6,12	СУМАХ ОТРУТНИЙ; СВІЖІ ЛИСТИ
4	Belladonna CH 6,30,50,200,1000 x 3,6,12	БЕЛАДОНА; УСЯ СВІЖА РОСЛИНА (КВІТЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ)

Таблиця 2А

Вибір препаратів (чоловіки)

Вік \ Стадія	I стадія	II стадія
До 27 років	П-А П-С	П-В П-С
27 - 45 років	П-А П-В	П-С П-В
Після 45	П-В П-С	П-В П-Д

Примітка: виділений жирним шрифтом препарат вважається базовим; другий препарат вважається препаратом вибору.

Таблиця 2Б

Вибір препаратів (жінки)

Вік \ Стадія	I стадія	II стадія
До 27 років	П-А П-Д	П-Д П-С
27 - 45 років	П-Д П-В	П-Д П-С
Після 45	П-Д П-С	П-С П-В

Примітка: виділений жирним шрифтом препарат вважається базовим; другий препарат вважається препаратом вибору.

Таблиця 3

Підбір препаратів з урахуванням конституціональних особливостей

Астенічний	Пікнічний	Атлетичний	Диспластичний
П-А	П-У	П-А	П-Д
П-З	П-Д	П-У	П-У

Примітка: зазначені в таблиці 3 препарати вважаються препаратами вибору; за відсутності динаміки після курсу лікування базовим препаратом з таблиці 2 зазначені в таблиці 3 препарати вважаються базовими.